

**適用拡大登録**

区 分	殺 虫 剤
農 薬 名	ヤシマアドマイヤー 1 粒剤
登 録 番 号	第 18219 号
登 録 日	平成 20 年 3 月 5 日
<有効成分>	イミダクロプリド 1.0%

**適用拡大登録内容**

- 1) 作物名「未成熟そらまめ」を追加し、作物名「豆類（未成熟、ただし、さやいんげんを除く）」を「豆類（未成熟、ただし、さやいんげん、未成熟そらまめを除く）」に変更する。
- 2) 作物名「レタス」（適用病害虫名：アブラムシ類）を追加する。
- 3) 作物名「キャベツ」の「イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数」を「3 回以内（定植時の土壌混和は 1 回以内、散布は 2 回以内）」から「3 回以内（育苗トレイへの灌注及び定植時の土壌混和は合計 1 回以内、散布は 2 回以内）」に変更する。
- 4) 作物名「にら」に使用方法「株元散布」及び使用時期「収穫 30 日前まで」を追加し、「イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数」を「1 回」から「2 回以内（定植時の土壌混和は 1 回以内、株元散布は 1 回以内）」に変更する。
- 5) 作物名「すいか（露地栽培）」及び「すいか（施設栽培）」を作物名「すいか」に変更し、適用病害虫名「アブラムシ類」に使用量「1g/株（植穴土壌混和）」を追加する。また作物名「すいか」の使用量に「(3kg/10a)」を追加する。
- 6) 作物名「ゆり」を「花き類・観葉植物（きく、ばら、ペチュニア、レザーファンを除く）」に変更する。
- 7) 作物名「ペチュニア」の使用量に「2g/株（6kg/10a）」（使用時期：生育期、使用方法：株元散布）を追加する。
- 8) 作物名「レザーファン」及び「ポインセチア」の適用病害虫名に「アブラムシ類」を追加する。
- 9) 作物名「ばら」の使用量及び本剤の使用回数をそれぞれ「2g/株（6kg/10a）」及び「5 回以内」に変更し、適用病害虫名「アブラムシ類」（使用方法：株元散布）を追加する。

## 【変更部分】

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イダクプロリドを含む農薬の総使用回数
未成熟そらまめ	—	アブラムシ類	2g/植穴	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (定植時及びは種時の土壌混和は合計1回以内)
			3kg/10a	は種時		播溝土壌混和	
2g/植穴			定植時	植穴土壌混和		3回以内 (定植時及びは種時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)	
3kg/10a			は種時	播溝土壌混和			
レタス			0.5g/株	育苗期後半		株元散布	3回以内 (育苗期の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
キャベツ			0.5g/株	定植時		植穴土壌混和	3回以内 (育苗トレイへの灌注及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
にら		ネギアザミウマ	4kg/10a	定植時		植溝土壌混和	2回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、株元散布は1回以内)
				収穫30日前まで		株元散布	
すいか		アブラムシ類	5g/株 (3kg/10a)	定植時		株元土壌混和	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)
						1~5g/株 (3kg/10a)	
	ミナミキイロアザミウマ		1~2g/株 (3kg/10a)				
花き類・観葉植物 (きく、ばら、ペチュニア、レザーフアンを除く)	アブラムシ類	2g/株 (6kg/10a)	生育期	5回以内	株元散布	5回以内	

【変更部分】

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イダクプロットを含む農薬の総使用回数
きく	—	ミナミキイロ アザミウマ	3kg/10a	生育期	5回以内	散布	5回以内
ペチュニア		アブラムシ類	2g/株 (6kg/10a)			株元散布	
			1g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	
レザーファン		アザミウマ類	1g/株 (3kg/10a)	生育期	5回以内	株元土壌混和	
ポインセチア		アブラムシ類	2g/株 (6kg/10a)			株元散布	
			コナジラミ類			1g/株 (3kg/10a)	
ばら		イバラヒゲナガ アブラムシ	2g/株 (6kg/10a)			株元散布	
		アブラムシ類					