

適用拡大登録

区 分	除草剤
農 薬 名	協友イッテツジャンボ
登 録 番 号	第 21601 号
登 録 日	平成 21 年 7 月 8 日
< 有効成分 >	
イマゾスルホン	2.25%
カエンストール	7.5%
ベンゾピシロン	5.0%

登録内容

* 作物名「移植水稻」に適用雑草名「コウキヤガラ（関東・東山・東海）」を追加する。

(変更後)

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ (北海道を除く) ヘラオモダカ (北海道、東北) シズイ(東北) オモダカ (関東・東山・東海) クログワイ (東北、関東・東山・東海、 近畿・中国・四国) コウキヤガラ (関東・東山・東海) ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類 による表層はく離 (東北、関東・東山・東海 を除く)	移植後 5 日 ~ ル I 2.5 葉期 ただし、 移植後 30 日 まで	砂壤土 ~ 埴土	小包装 (パック) 10 個 (400g) /10a	1 回	水田に小包装 (パック)のまま 投げ入れる。	全域の 普通期 栽培地帯 及び 早期 栽培地帯
直播水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ セリ	稲 1 葉期 ~ ル I 2.5 葉期 ただし、 収穫 90 日前 まで	壤土 ~ 埴土				全 域

イマズスルフロンを含む 農薬の総使用回数	カフェンストロ - ルを含む 農薬の総使用回数	ベンゾピシクロンを含む 農薬の総使用回数
2 回以内	1 回	2 回以内