

**適用拡大登録**

区 分	除草剤
農 薬 名	協友イッテツフロアブル
登 録 番 号	第 2 1 5 8 2 号
登 録 日	平成 22 年 5 月 26 日
<有効成分>	
イゾスルホン	1.7%
カエンストロール	5.7%
ベンゾピシロン	3.8%

**登録内容**

- ・作物名「移植水稻」に適用雑草名「クログワイ（九州）」、「コウキヤガラ（九州）」を追加する。

## 【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ(北海道を除く) ヘラオモダカ (北海道、東北、九州) ヒルムシロ(北陸を除く) セリ イノヤクガサ(北海道) シズイ(東北) オモダカ(北海道、東北) クログワイ (東北、関東・東山・東海、近畿・中国・四国、九州) コウキヤガラ(東北、関東・東山・東海、九州) アオミドロ・藻類による 表層はく離(北陸を除く)	移植後 5 日 ~ ル I 2.5 葉期 ただし、 移植後 30 日 まで	砂壤土 ~ 埴土	500mL /10a	1 回	原液湛水散布、 水口施用又は無人ヘリコプターによる 滴下	全域の 普通期 及び早期 栽培地帯
直播水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	稲 1 葉期 ~ ル I 2.5 葉期 ただし、 収穫 90 日前 まで	砂壤土 ~ 埴土	500mL /10a	1 回	原液湛水散布	全域

イマゾメタリンを含む 農薬の総使用回数	カエントロルを含む 農薬の総使用回数	ベンゾビシロンを含む 農薬の総使用回数
2 回以内	1 回	2 回以内