

適用拡大登録

区 分	除草剤
農 薬 名	カルナクス
登 録 番 号	第 21941 号
登 録 日	平成 22 年 10 月 13 日
<有効成分>	
グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	41.0%

登録内容

作物名「果樹類（キウイフルーツ、パイナップルを除く）」を「果樹類（パイナップルを除く）」に変更する。

作物名「小麦」に適用場所「圃場内の周縁部」を追加する。

作物名「小麦」の適用雑草名「多年生イネ科雑草」及び「一年生雑草」の使用時期「耕起前まで（雑草生育期：草丈 30cm 以下）」を「耕起前又はは種前まで（雑草生育期：草丈 30cm 以下）」に変更する。

作物名「小麦」の適用雑草名「一年生雑草」の使用時期「は種 7 日以前又はは種後出芽前（雑草生育期）」を「は種後出芽前（雑草生育期）」に変更する。

作物名「小麦」及び「麦類（小麦を除く）」のグリホサートを含む農薬の総使用回数を「1 回」から「3 回以内」に変更する。

作物名「小麦」の適用雑草名「多年生イネ科雑草」及び「一年生雑草」の本剤の使用回数を「1 回」から「3 回以内」に変更する。

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
果樹類 (パイナップルを除く)	-	一年生雑草	収穫 7 日前まで (雑草生育期： 草丈 30cm 以下)	250 ~ 500 mL/10a	通常散布 50 ~ 100L/10a	3 回 以内	雑草 茎葉 散布	3 回以内
		多年生雑草		500 ~ 1000 mL/10a	少量散布 25 ~ 50L/10a			
小麦	-	多年生イネ科 雑草	耕起前又は は種前まで (雑草生育期： 草丈 30cm 以下)	250 ~ 500 mL/10a	25 ~ 100L/10a	3 回 以内	雑草 茎葉 散布	3 回以内
		一年生雑草						
		多年生雑草	耕起 7 日前まで (雑草生育期： 草丈 30cm 以下)	500 ~ 1000 mL/10a	100L/10a	1 回		
	圃場内の 周縁部	一年生雑草	収穫 7 日前まで (雑草生育期)	250mL/10a	25 ~ 100L/10a	3 回 以内		
麦類 (小麦を除く)	-		耕起 7 日前まで (雑草生育期)	250 ~ 500 mL/10a	100L/10a	1 回		

作物名「かんしょ」の使用時期「耕起 7 日前まで（雑草生育期）」を「耕起又は挿苗 7 日前まで（雑草生育期）」に変更する。

作物名「だいこん」及び「はつかだいこん」の使用時期「耕起 7 日前まで（雑草生育期）」を「耕起又はは種 7 日前まで（雑草生育期）」に変更する。

作物名「キャベツ」、「はくさい」、「ねぎ」及び「たまねぎ」の使用時期「耕起 7 日前まで（雑草生育期）」を「耕起又は定植 7 日前まで（雑草生育期）」に変更する。

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
かんしょ	-	一年生雑草	耕起又は挿苗 7 日前まで (雑草生育期)	250 ~ 500 mL/10a	100L/10a	1 回		1 回
だいこん はつかだい こん			耕起又はは種 7 日前まで (雑草生育期)					
キャベツ はくさい			耕起又は定植 7 日前まで (雑草生育期)					
ねぎ たまねぎ			定植後畦間処理 但し、収穫 30 日 前まで (雑草生育期)	通常散布 50 ~ 100L/10a 少量散布 25 ~ 50L/10a	3 回 以内	3 回以内		

作物名「花木」を「樹木類」に変更する。

作物名「牧草」の本剤の使用回数を「1 回」から「2 回以内」に変更する。

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
樹木類	-	一年生雑草	雑草生育期	250 ~ 500 mL/10a	通常散布 50 ~ 100L/10a 少量散布 25 ~ 50L/10a	4 回 以内		4 回以内
牧草	牧野、 草地 (更新・ 造成)	多年生雑草	更新・造成の 10 日前まで (雑草生育期)	500 ~ 1000 mL/10a	50L/10a	2 回 以内	雑草 茎葉 散布	2 回以内
		一年生及び 多年生雑草	は種 10 日前 ~ は種当日 (耕起整地後： 雑草発生揃期)	250 ~ 500 mL/10a	少量散布 25 ~ 50L/10a			

作物名「樹木等」に使用方法「植栽地を除く樹木等の周辺地に切株塗布処理」を追加する。

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサトを含む農薬の総使用回数
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等	落葉 雑かん木	5～ 10月	原液又は 2倍液	1mL/ヶ所 樹径 10cm 以下 10～20cm 20cm 以上	-	立木注入 処理	-
		雑かん木	伐採 直後		ヶ所 数 2～3 4～8 10		植栽地を 除く樹木 等の周辺 地に切株 塗布処理	

【追加注意事項】

- ・雑かん木に塗布処理を行う場合は、伐採後、直ちに切り口全面に直接塗布すること。