

適用拡大登録

区 分	除草剤
農 薬 名	キチットジャンボ
登 録 番 号	第 21648 号
登 録 日	平成 21 年 7 月 22 日
<有効成分>	
イゾスルロン	2.25%
オキサクロメチン	1.5%
ベンゾビシロン	5.0%

登録内容

適用雑草名に「シズイ（東北）」を追加する。
コウキヤガラの適用地帯に「九州」を追加する。

(変更後)

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ (北海道、東北) オモダカ ミズガヤツリ (北海道を除く) ウリカワ ヒルムシロ セリ(北陸を除く) クログワイ (北海道を除く) コウキヤガラ (関東・東山・東海、九州) シズイ(東北) アオミドロ・藻類 による表層はく離 (九州を除く)	移植後 5 日 ~ ノビエ 2.5 葉期 但し、移植後 30 日まで	砂壤土 ~ 埴土	小包装 (ﾊﾟｯｸ) 10 個 (400g) /10 a	1 回	水田に 小包装 (ﾊﾟｯｸ)の まま投げ 入れる	全域の 普通期 及び 早期栽培 地帯
直播水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ (北海道を除く) ウリカワ セリ	イネ 1.0 葉期 ~ ノビエ 2.5 葉期 但し、収穫 90 日前まで	壤土 ~ 埴土				全域(九州 を除く)

イマゾスルフロンを 含む 農薬の総使用回数	オキサジクロメホンを 含む 農薬の総使用回数	ベンゾピシクロンを 含む 農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内	2 回以内