

適用拡大登録

区 分	除草剤
農 薬 名	キットフロアブル
登 録 番 号	第 21836 号
登 録 日	平成 20 年 11 月 19 日
< 有効成分 >	
イゾキサロン	1.7%
ピリジノール	1.2%
ベンゾピリジノール	3.8%

適用拡大登録内容

適用雑草名に「オモダカ、クログワイ(北海道を除く)、コウキヤガラ(関東・東山・東海)、シズイ(東北)」を追加する。

九州の普通期及び早期栽培地帯の適用土壌「壤土～埴土」の部分の使用時期を「移植後 5 日～ノビエ 2.5 葉期 但し、移植後 30 日まで」から「移植直後～ノビエ 2.5 葉期 但し、移植後 30 日まで」に変更する。

関東・東山・東海の使用時期「移植後 5 日～ノビエ 2.5 葉期 但し、移植後 30 日まで」に適用土壌「砂壤土」を追加する。

作物名「移植水稻」の適用地帯を「全域の普通期及び早期栽培地帯」にまとめる。

作物名に「直播水稻」を追加する。

作物名「移植水稻」の使用方法に「無人ヘリコプターによる滴下」を追加する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ (北海道、東北) ミズガヤツリ (北海道を除く) ウリカワ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ (北海道を除く)	移植直後～ ノビエ 2.5 葉期 但し、移植後 30 日まで	壤土～ 埴土	500ml/ 10 a	1 回	原液湛水散布又は無人ヘリコプターによる滴下	全域の 普通期及び 早期栽培地帯
	コウキヤガラ (関東・東山・東海) シズイ(東北) アオミドロ・藻類 による表層はく離	移植後 5 日～ ノビエ 2.5 葉期 但し、移植後 30 日まで	砂壤土				
直播水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ (北海道を除く) ウリカワ セリ	イネ 1.0 葉期～ ノビエ 2.5 葉期 但し、収穫 90 日前まで	壤土～ 埴土			原液湛水散布	全域 (九州を除く)

イマズスルフロン を含む 農薬の総使用回数	オキサジクロメホン を含む 農薬の総使用回数	ベンゾピシクロン を含む 農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内	2 回以内