

## 適用拡大登録

区 分	除草剤
農 薬 名	キット1 粒剤
登 録 番 号	第 21647 号
登 録 日	平成 21 年 9 月 15 日
<有効成分>	
イソキサリフロン	0.9%
グリホサート	0.8%
ベンゾビシロン	2.0%

## 登録内容

適用作物「移植水稻」の使用時期に「移植時」を追加し、使用方法を「田植同時散布機で施用」とする。

適用雑草名に「シズイ（東北）」を追加する。

コウキヤガラの適用地帯に「九州」を追加する。

( 変更後 )

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯		
移植水稲	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ (北海道、東北) オモダカ ミズガヤツリ (北海道を除く) ウリカワ ヒルムシロ セリ(北陸を除く) クログワイ (北海道を除く) コウキヤガラ (関東・東山・東海、九州) シズイ(東北) アオミドロ・藻類による表層はく離	移植時	壤土～ 埴土	1kg/ 10a	1 回	田植同時散布機で施用	全域の普通期及び早期栽培地帯		
		移植直後～ ノビエ 2.5 葉期 但し、移植後 30 日まで				砂壤土	湛水散布	関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯	
		移植後 5 日～ ノビエ 2.5 葉期 但し、移植後 30 日まで	砂壤土～ 埴土						関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯
		移植直後～ ノビエ 2.5 葉期 但し、移植後 30 日まで							
直播水稲	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ (北海道を除く) ウリカワ	イネ 1.0 葉期～ ノビエ 2.5 葉期 但し、収穫 90 日前まで	壤土～ 埴土				全域		

イマゾスルフロンを含む 農薬の総使用回数	オキサジクロメホンを 含む 農薬の総使用回数	ベンゾピシクロンを 含む 農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内	2 回以内