

## 適用拡大登録

区 分	除草剤
農 薬 名	キット1 粒剤
登 録 番 号	第 21647 号
登 録 日	平成 22 年 5 月 26 日
< 有効成分 >	
イソプロピル	0.9%
グリホサート	0.8%
ベンゾヒシロン	2.0%

## 登録内容

適用雑草コウキヤガラの適用地域に「東北」を追加する

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	
移植 水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ (北海道、東北) オモダカ ミズガヤツリ (北海道を除く) ウリカワ ヒルムシロ セリ(北陸を除く) クログワイ (北海道を除く) コウキヤガラ (東北、関東・東 山・東海、九州) シズイ(東北) アオミドロ・藻類 による表層はく離	移植時	壤土～ 埴土	1kg/ 10a	1 回	田植 同時 散布 機で 施用	全域の普通期 及び早期栽培 地帯	
	移植直後～ ノビエ 2.5 葉期 但し、 移植後 30 日まで	砂壤土				湛水 散布	全域(関東・ 東山・東海を 除く)の普通 期及び早期栽 培地帯	
	移植後 5 日～ ノビエ 2.5 葉期 但し、 移植後 30 日まで		砂壤土～ 埴土					関東・東山・ 東海の普通期 及び早期栽培 地帯
	移植直後～ ノビエ 2.5 葉期 但し、 移植後 30 日まで							
直播水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズカヤツリ (北海道を除く) ウリカワ	イネ 1.0 葉期～ ノビエ 2.5 葉期 但し、 収穫 90 日前まで	壤土～ 埴土				全域	

イマゾスルフロンを 含む農薬の総使用回数	オキサジクロメホンを 含む農薬の総使用回数	ベンゾピシクロンを 含む農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内	2 回以内