

適用拡大登録

区 分	除草剤
農 薬 名	サラブレッドフロアブル
登 録 番 号	第 20434 号
登 録 日	平成 21 年 9 月 15 日
< 有効成分 >	
イゾスルホン	1.7%
オキサリメチル	1.2%
グリホサート	18.0%

登録内容

移植水稻の使用時期に「移植時」を追加し、使用方法を「田植同時散布機で施用」とする。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ (北海道を除く) ヘラオモダカ (北海道、東北、北陸) オモダカ (東北、関東・東山・東海) ヒルムシロ (北陸を除く) セリ クログワイ (東北、関東・東山・東海) シズイ(東北) アオミドロ・藻類による表層はく離	移植時	砂壤土 ～ 埴土	500mL /10a	1 回	田植同時散布機で施用	全域の普通期及び早期栽培地帯
		移植直後～ 北 I 2.5 葉期 但し 移植後 30 日 まで				原液湛水散布又は水口施用	

イゾスルホンを含む農薬の総使用回数	オキサリメチルを含む農薬の総使用回数	グリホサートを含む農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内	3 回以内 (育苗箱散布は 1 回以内、 本田では 2 回以内)