

### 適用拡大登録

区 分	除草剤
農 薬 名	サラブレッドRXフロアブル
登 録 番 号	第 20948 号
登 録 日	平成 21 年 9 月 15 日
< 有効成分 >	
イゾスルロン	1.7%
グリホサート	1.2%
グリホサート	6.6%
グリホサート	9.5%

### 登録内容

移植水稻の使用時期に「移植時」を追加し、使用方法を「田植同時散布機で施用」とする。

#### 【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	グリホサートを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ (北海道を除く) ヘラオモダカ (北海道、東北) ヒルムシロ セリ クログワイ (関東・東山・東海、 近畿・中国・四国) アオミドロ・藻類に よる表層はく離	移植時	砂壤土～ 埴土	500mL /10a	1 回	田植同時散布機で施用	全域の普通期及び早期栽培地帯	3 回以内 (育苗箱散布は 1 回以内、 本田では 2 回以内)
		移植直後～ ルイ 2.5 葉期 但し 移植後 30 日 まで				原液湛水散布又は水口施用		
直播水稻	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	ルイ 1.0 葉期～ ルイ 2.5 葉期 但し 収穫 90 日前 まで				原液湛水散布	全域	2 回以内

イゾスルロンを含む農薬の総使用回数	グリホサートを含む農薬の総使用回数	グリホサートを含む農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内	2 回以内