

適用拡大登録

区 分	除 草 剤
農 薬 名	協友サンシャイン 1 キロ粒剤
登 録 番 号	第 22119 号
登 録 日	平成 22 年 7 月 21 日
< 有効成分 >	
ピラクロニル	2.0%
ベンゾピシクロン	2.0%

登録内容

適用地帯「北海道」の適用土壌「壤土～埴土」および適用地帯「東北、北陸、関東・東山・東海、近畿・中国・四国」の適用土壌「砂壤土～埴土」の使用時期に「移植直後」を追加する。
 適用地帯「北海道」の適用土壌「壤土～埴土」および適用地帯「東北、北陸、関東・東山・東海、近畿・中国・四国」の適用土壌「砂壤土～埴土」の使用時期に「移植時」、使用方法「田植同時散布機で施用」を追加する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ (北海道を除く) ヘラオモダカ (北海道、東北) ヒルムシロ クログワイ(東北、 関東・東山・東海、 近畿・中国・四国) オモダカ(東北、関 東・東山・東海) コウキヤガラ (関東・東山・東海、 九州) シズイ(東北)	移植後 3 日～ ル I 2 葉期 ただし、移植後 30 日まで	砂壤土	1 kg/10a	1 回	湛水散布	北海道
		移植直後～ ル I 2 葉期 ただし、移植後 30 日まで	壤土～埴土				全域(北海道、 九州を除く) の普通期及び 早期栽培地帯
		移植後 3 日～ ル I 2 葉期 ただし、移植後 30 日まで	砂壤土～ 埴土				九州の普通期 及び早期栽培 地帯
		移植時	壤土～埴土 砂壤土～ 埴土			田植同時散布 機で施用	北海道 全域(北海道、 九州を除く) の普通期及び 早期栽培地帯

ピラクロニルを含む 農薬の総使用回数	ベンゾピシクロンを含む 農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内