

適用拡大登録

区 分	除草剤
農 薬 名	ヤシマシーゼットフロアブル
登 録 番 号	第 1 7 5 0 9 号
登 録 日	平成 21 年 9 月 15 日
< 有効成分 >	
ピリフチカブ	5.7%
ブメイホ	10.0%
ベンゾフェナブ	12.0%

登録内容

- ・作物名「移植水稻」の使用時期「移植直後～移植後 10 日(ルイ 1.5 葉期まで)」を「移植直後～ルイ 1.5 葉期 ただし、移植後 30 日まで」に変更する。
- ・作物名「移植水稻」の使用時期「移植直後～移植後 5 日(ルイ 1 葉期まで)(移植後に使用する除草剤との体系で使用)」を「移植直後～ルイ 1 葉期 ただし、移植後 30 日まで」に変更する。
- ・作物名「移植水稻」の使用液量「1L/10a」および「0.8～1L/10a」に使用時期「移植時」、使用方法「田植同時散布機で施用」を追加する。
- ・作物名「移植水稻」の適用土壌「砂壤土～埴土(減水深 2cm/日以下)」を「砂壤土～埴土」に変更する。
- ・作物名「移植水稻」の適用地帯「関東以西の普通期及び早期栽培地帯」の記載を「関東・東山・東海、近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯」に変更。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯								
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ ヘラオモダカ	移植時	砂壤土 ～ 埴土	原液	1L/10a	1 回	田植同時散布機で施用	北海道 東北 北陸								
		移植直後～ ルイ1.5葉期 ただし、 移植後30日 まで					湛水散布、 水口施用 又は 無人ヘリコ プターによる 滴下									
	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ	移植時			砂壤土 ～ 埴土		原液		0.8～ 1L/10a	1 回	田植同時散布機で施用	関東・東 山・東海、 近畿・中 国・四国、 九州の普 通期及び 早期栽培 地帯				
		移植直後～ ルイ1.5葉期 ただし、 移植後30日 まで									湛水散布、 水口施用 又は 無人ヘリコ プターによる 滴下					
	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ	移植直後～ ルイ1葉期 ただし、 移植後30日 まで							砂壤土 ～ 埴土		原液		0.5L/ 10a (少量 散布)	1 回	湛水散布	全域の普 通期及び 早期栽培 地帯

ピリブチカルブを含む 農薬の総使用回数	プロモブチドを含む 農薬の総使用回数	ベンゾフェナップを含む 農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	2回以内