

平成22年12月13日

関係各位

協友アグリ株式会社

新規水稲用一発処理除草剤

「ゼータワン」、「ピクトリーZ」登録のご案内(速報)

登録申請中の新規水稲用一発処理除草剤「ゼータワン」「ピクトリーZ」が平成22年12月13日付けにて農薬登録を取得しました。

「ゼータワン」、「ピクトリーZ」は住友化学株式会社が開発した新規除草成分プロピリスルフロンを含有する新規水稲用一発処理除草剤であり、「ゼータワン」はプロピリスルフロ単一成分、「ピクトリーZ」はプロピリスルフロに弊社協友アグリの自社原体ピラクロニルの二成分を有効成分としております。

両剤とも少成分であり、多様な使用方法にお応えするために、3剤型(1キロ粒剤・フロアブル、ジャンボ)を取り揃えております。

SU抵抗性を含む難防除雑草対策、減農薬栽培に適した水稲用一発処理除草剤としてご活用頂けるものと確信しております。

まずは取り急ぎ、「ゼータワン」「ピクトリーZ」が登録取得しましたことをご案内申し上げます。

平成23年度は、「ゼータワン」、「ピクトリーZ」とも展示試験の年と位置づけ、各県における公的展示圃試験、全農合理化圃場試験、現地での実証圃試験を積み重ね、地域にあった除草体系の確立に注力していく所存です。

以下に登録内容を示します。ご参照頂ければ幸いです。

敬 具

記

<平成22年12月13日付登録の新規剤>

- ・ 協友ゼータワン1キロ粒剤 【第22835号】
- ・ 協友ゼータワンジャンボ 【第22845号】
- ・ 協友ゼータワンフロアブル 【第22837号】
- ・ ピクトリーZ1キロ粒剤 【第22843号】
- ・ ピクトリーZジャンボ 【第22839号】
- ・ ピクトリーZフロアブル 【第22841号】

<本剤に関するお問い合わせ先>

協友アグリ株式会社 普及部

〒213-0002

神奈川県川崎市高津区二子 6-14-10

TEL:044-813-4206

登録番号:第22835号

名 称:協友ゼータワン 1キログラム剤

有効成分:プロピリスルフロンの0.9%

【適用表】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ (北海道を除く) ヘラオモダカ (北海道) ヒルムシロ セリ (九州を除く)	移植後5日 ~ノビ' E 2.5葉期 ただし、移植後30日まで	砂壤土 ~ 埴土	1kg /10a	2回以内	湛水 散布	全域の 普通期 及び早期 栽培地帯

プロピリスルフロンを含む
農薬の総使用回数

2回以内

登録番号:第22845号

名 称:協友ゼータワンジャンボ

有効成分:プロピリスルフロン…2.25%

【適用表】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ (北海道、東北) ミスガヤツリ (北海道を除く) ウリカワ ヒルムシロ セリ イソノサヤヌカクサ (北海道) オモダカ クログワイ (北海道を除く) コウキヤガラ (関東・東山・東海、九州)	移植後5日~ ノビエ3葉期 ただし、移植後 30日まで	砂壤土 ~ 埴土	小包装 (8'ック) 10個 (400g) /10a	1回	水田に 小包装(8'ック) のまま投げ入れる。	全域の普 通期及び 早期栽培 地帯

プロピリスルフロンを含む 農薬の総使用回数
2回以内

登録番号:第22837号

名 称:協友ゼータワンフロアブル

有効成分:プロピリスルフロン…1.7%

【適用表】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用 土 壤	使用 量	本 剤 の 使 用 回 数	使 用 方 法	適 用 地 帯
移植 水 稻	水田一年生雑草及び マ ツ バ イ ホ タ ル イ ウ リ カ ワ ミズガヤツリ (北海道を除く) ヘラオモダカ (北海道、東北) ヒルムシロ セ (北陸、九州 を除く)	移植後5日 ~ ノヒ、イ 2.5葉期 ただし、移 植後30日 まで	砂壤土 ~ 埴土	500 mL / 10a	2 回 以 内	原液湛水散布	東 北
			壤 土 ~ 埴土				全 域 (東北を除 く)の普通期 及び早期栽 培 地 帯

プロピリスルフロンを含む 農薬の総使用回数
2回以内

登録番号:第22843号

名 称:ピクトリーZ1キロ粒剤

有効成分:ピラクロニル…2.0% プロピリスルフロ…0.9%

【適用表】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草 及 び マ ッ バ イ ホ タ ル イ ウ リ カ ワ ミズガヤツリ (北海道を除く) ヘラオモダカ (北海道、東北) ヒ ル ム シ ロ (北陸を除く) セ リ エツノサヤヌカガサ (北海道)	移植後5日~ ル' E 3 葉期 ただし、 移植後30日 ま で	壤 土 ~ 埴土	1kg /10a	1 回	湛水 散布	北海道
	オモダカ (北海道) アオミドロ・ 藻類による 表層はく離 (北海道、東北を除く)	移植後5日~ ル' E 2.5 葉期 ただし、 移植後30日 ま で	砂壤土 ~ 埴土				全域(北海道、 九州を除く)の 普通期及び早 期栽培地帯
							九州の普通期 及び早期栽培 地 帯

ピラクロニルを 含む農薬の総使用回数	プロピリスルフロンを 含む農薬の総使用回数
2回以内	2回以内

登録番号:第22839号

名 称:ピクトリーZジャンボ

有効成分:ピラクロニル…5.0% プロピリスルフロン…2.25%

【適用表】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ (北海道、東北) ミズガヤツリ (北海道を除く) ウリカワ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類に よる表層はく離 (北陸、関東・東山・ 東海、近畿・中国・ 四 国)	移植後5日～ ル'Ⅰ3葉期 ただし、移植後 30日まで	壤土 ～埴土	小包装 (ハ'ック) 10個 (400g) /10a	1回	水田に 小包装(ハ'ック) のまま投げ入れる。	北海道
		移植後5日～ ル'Ⅰ2.5葉期 ただし、移植後 30日まで	砂壤土 ～埴土				全域(北海道、九州を除く)の普通期及び早期栽培地帯
							九州の普通期及び早期栽培地帯

ピラクロニルを含む農薬の総使用回数	プロピリスルフロンを含む農薬の総使用回数
2回以内	2回以内

登録番号:第22841号

名 称:ピクトリーZフロアブル

有効成分:ピラクロニル…3.9% プロピリスルフロン…1.7%

【適用表】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草 及 び マ ッ バ イ ホ タ ル イ ウ リ カ ワ ミズガヤツリ (北海道を除く) ヘラオモダカ (北海道、東北) ヒ ル ム シ ロ セ リ エ'ノサヤヌカ'サ (北海道) シ ズ イ (東北) オモダカ (北海道、東北、 北陸、近畿・中国・四国) クログワイ (北陸、近畿・中国・四国) コウキヤガラ (東北、関東・東山・東海、九州)	移植後5日~ ル'エ3葉期 ただし、 移植後30日 ま で	壤 土 ~ 埴土	500ml /10a	1 回	原液 湛水 散布	北海道
	アオミドロ・ 藻類による 表層はく離 (関東・東山・東海、近畿・中国・ 四国、九州)	移植後5日~ ル'エ2.5葉期 ただし、 移植後30日 ま で	砂壤土 ~ 埴土				全域(北海道、 九州を除く)の 普通期及び早 期栽培地帯
							九州の普通期 及び早期栽培 地 帯

ピラクロニルを 含む農薬の総使用回数	プロピリスルフロンを 含む農薬の総使用回数
2回以内	2回以内