

**適用拡大登録**

区 分	殺 菌 剤
農 薬 名	タフブロック
登 録 番 号	第 21920 号
登 録 日	平成 22 年 7 月 7 日
<有効成分>	
タロマイセス フラハス SAY-Y-94-01 株	孢子 $\cdots 1 \times 10^8$ CFU/g

**登録内容**

- ・作物名「稲」の適用病害虫名「ばか苗病」「いもち病」「苗立枯細菌病」及び「もみ枯細菌病」の使用時期「浸種前」使用方法「湿粉衣」の希釈倍数を「種子重量の 4%」から「種子重量の 2~4%」に変更。
- ・作物名「稲」に適用病害虫名「苗立枯病(トリコテルマ菌)」を追加。

**【変更後】**

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	タロマイセス フラハスを含む農薬の総使用回数
稲	褐条病	200 倍	催芽時	—	24 時間種子浸漬	—
	ばか苗病 いもち病 苗立枯細菌病 もみ枯細菌病		催芽前		24~48 時間 種子浸漬	
		種子重量 の 2~4%	浸種前		湿粉衣	
		200 倍	催芽時		24 時間種子浸漬	
	催芽前		24~48 時間 種子浸漬			
	苗立枯病(フザリウム菌) 苗立枯病(リゾープス菌) 苗立枯病(トリコテルマ菌)	種子重量 の 4%	浸種前		湿粉衣	
	ばか苗病 いもち病 苗立枯細菌病 もみ枯細菌病	20 倍	浸種前~ 催芽前		1 時間種子浸漬	
浸種前						
稲 (箱育苗)	苗立枯病(リゾープス菌)	200 倍	は種時 覆土前	—	育苗箱(30×60 ×3cm、使用土壌 約 5ℓ)1 箱当り 希釈液 200ml を 土壌灌注する。	—