

**適用拡大登録**

区 分	殺 虫 剤
農 薬 名	協友ダントツ水溶剤
登 録 番 号	第 21646 号
登 録 日	平成 22 年 1 月 20 日
< 有効成分 >	
クロチアニジン	16.0%

**登録内容**

- ・ 作物名「ブルーベリーノアブラムシ類、ケムシ類」を追加する。
- ・ 作物名「チンゲンサイ」に適用病害虫名「ハモグリバエ類」を追加する。
- ・ 作物名「かんきつ」に適用病害虫名「ミカンコナジラミ」を追加する。
- ・ 作物名「茶」に適用病害虫名「ミカントゲコナジラミ」を追加する。
- ・ 作物名「きく」適用病害虫名「アザミウマ類」に使用方法「生育期株元灌注」を追加する。
- ・ 作物名「ブロッコリー」に適用病害虫名「コナガ」を追加する。
- ・ 作物名「かき」の適用病害虫名「チャノキイロアザミウマ」および「カキクダアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更する。
- ・ 作物名「稲」、「稲(箱育苗)」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数を「4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内)」に変更する。
- ・ 作物名「トマト」、「ミニトマト」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数を「4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)」に変更する。
- ・ 作物名「だいず」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数を「4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)」に変更する。

## 【 変更後 】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クワアジンを 含む農薬の 総使用回数
稲	ウンカ類 ツマク・ロコバ・イ カメムシ類 イネト・ロオムシ	4000 倍	60 ~ 150 L/10a	収穫 7 日 前まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (移植時までの 処理は 1 回以 内、本田での散 布、 空中散布、 無人ヘリ散布は 合計 3 回以内)
	ウンカ類 カメムシ類 イネト・ロオムシ	1000 倍	25L/10a				
稲 (箱育苗)	ウンカ類 ツマク・ロコバ・イ フタバ・コヤガ	200 倍	育苗箱 (30×60× 3cm、使用土 壌約 5L) 1 箱当り 500mL	移植 3 日 前 ~ 移植当日	1 回	育苗箱 の上か ら均一 に散布 する	
	イネト・ロオムシ イネミス・ソウムシ	200 ~ 400 倍					
ブロッコリー	コナガ アオムシ	2000 倍	100 ~ 300 L/10a	収穫 3 日 前まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (は種時の散 布、育苗期の株 元処理及び定植 時の植穴処理土 壌混和は合計 1 回以内、散布は 3 回以内)
	アブラムシ類	2000 ~ 4000 倍		収穫 14 日前まで			
チンゲンサイ	ハモク・リハ・I 類	2000 倍					3 回以内
かんきつ	アブラムシ類 ミカンハモク・リガ アザミウマ類 ケシキスイ類 コアオハナムケ・リ ツノロウムシ コナカイガラムシ類 ゴマダ・ラカミキリ カメムシ類 アゲハ類 アカマルカイガラムシ	2000 ~ 4000 倍	200 ~ 700L/10a	収穫 7 日 前まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (樹幹散布は 1 回以内、 散布は 3 回以内)
	ミカンハ・I ミカンキジ・ラミ ミカンコナジ・ラミ	2000 倍					
	ミカンハモク・リガ	20 倍	100mL/樹	収穫 150 日前まで	1 回	樹幹散布	
	ミカンキジ・ラミ	40 倍	200mL/樹				
だいず	マメシクイガ	2000 倍	100 ~ 300 L/10a	収穫 7 日 前まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (は種時の土壌 混和は 1 回以内、 散布は 3 回以内)
	アブラムシ類 カメムシ類 フタスジ・ヒメハムシ	2000 ~ 4000 倍					
トマト ミニトマト	アブラムシ類 コナジ・ラミ類		100 ~ 300 L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (育苗期の株元 処理及び定植時 の土壌混和は合 計 1 回以内、散 布及び定植後の 株元散布は合計 3 回以内)
	ハモク・リハ・I 類	2000 倍					

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	クロチアジンを 含む農薬の 総使用回数	
茶	ミカントゲ コナジ ラミ マダ ラサハラハムシ	2000 倍	200 ~ 400L/10a	摘採 7 日 前まで	1 回	散布	1 回	
	チャノキイロアサ ミウマ チャノミト リヒメコハ イ チャノホソガ	2000 ~ 4000 倍						
	コムカンアブ ラムシ	4000 倍						
かき	カキヒメコハ イ	2000 ~ 4000 倍	200 ~ 700L/10a	収穫 7 日 前まで	3 回 以内		3 回以内	
	アサ ミウマ類 コナカイガ ラムシ類 カキノハタムシガ カメムシ類							
ブルヘーリー	アブ ラムシ類	2000 倍		2000 ~ 4000 倍				収穫 45 日前まで
	ケムシ類							
きく	ナモク リハ イ アサ ミウマ類 アブ ラムシ類	4000 倍	1L/m <sup>2</sup>	発生初期	4 回 以内	生育期 株元灌注		4 回以内
	アサ ミウマ類	2000 倍	100 ~ 300L/10a					
	アブ ラムシ類 カメムシ類 ハモク リハ イ類	2000 ~ 4000 倍						