

適用拡大登録

区 分	殺 虫 剤
農 薬 名	協友ダントツ水溶剤
登 録 番 号	第 21646 号
登 録 日	平成 22 年 10 月 27 日
< 有効成分 >	
加チアジソン	16.0%

登録内容

- ・作物名「てんさい」の使用方法「苗床灌注」に適用害虫名「アブラムシ類」を追加する。
- ・作物名「ぶどう」に適用害虫名「ブドウトラカミキリ」を追加する。
- ・作物名「かんきつ(苗木)」に適用害虫名「アゲハ類」を追加する。
- ・作物名「ブルーベリー」の適用害虫名「アブラムシ類」の希釈倍数を「2000 倍」から「2000～4000 倍」に変更する。
- ・作物名「にら(花茎)」、「はなっこりー」および「オリーブ」を追加する。

【変更及び追加部分】

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	知アジンを 含む農薬の 総使用回数
てんさい	テンサイトビハムシ カメノコハムシ テンサイワガリハバエ アブラムシ類	100～ 200 倍	1L/ハ [°] -ハ [°] - ホ [°] ット1冊 (3L/m ²)	定植前	1 回	苗床灌注	4 回以内 (定植前の 苗床灌注は 1 回以内、 散布は 3 回以内)
ぶどう	コナカイガラムシ類 チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバエ ブドウトラカミキリ	2000～ 4000 倍	200～700 L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内
かんきつ (苗木)	ミカンハモグリガ ゴマダラカミキリ アゲハ類	20 倍	10～100 mL/樹	春芽・夏芽又は 秋芽の発生前		樹幹散布	
ブルーベリー	アブラムシ類 ケムシ類	2000～ 4000 倍	200～700 L/10a	収穫 45 日前まで		散布	
にら (花茎)	アブラムシ類 ネギアザミウマ	4000 倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	2 回以内		3 回以内 (は種時の 土壌混和は 1 回以内、 散布は 2 回以内)
はなっこりー	アブラムシ類	2000 倍				200～700 L/10a	2 回以内
オリーブ	オリブアナキ ゾウムシ		200～700 L/10a				2 回以内