

**適用拡大登録**

区 分	殺 虫 剤
農 薬 名	協友ダントツ粒剤
登 録 番 号	第 21645 号
登 録 日	平成 20 年 3 月 5 日
<有効成分>	クロチアニジン 0.50 %

**適用拡大登録内容**

## (1)作物名の追加

- ①作物名「さとうきび」を追加する。
- ②作物名「げっきつ」を追加する。
- ③作物名「ブロッコリー」を追加する。
- ④作物名「非結球レタス」を追加する。

## (2)使用時期の追加

- ①作物名「稲」の使用時期を「収穫 14 日前まで」から「収穫 7 日前まで」に変更する。
- ②作物名「トマト」および「ミニトマト」の使用時期に「育苗期後半」を追加する。
- ③作物名「ねぎ（露地栽培）」／使用時期「植付時」／使用方法「植溝処理」を追加する。

## (3)総使用回数の変更

- ・作物名「トマト」及び「ミニトマト」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数を、「4 回以内(鉢上時の株元処理及び定植時の土壌混和は合計 1 回以内、散布は 3 回以内)」を「4 回以内(鉢上時の株元処理、育苗期後半の株元処理及び定植時の土壌混和は合計 1 回以内、散布は 3 回以内)」に変更する。

## (4)適用病害虫名の追加

- ①「きゅうり」：
  - ・使用量「1g/株」／使用時期「育苗期後半」に適用病害虫名「メジロアザミ」を追加する。
- ②「メロン」：
  - ・使用量「1g/株」／使用時期「育苗期後半」に適用病害虫名「コジラシ類」を追加する。
- ③「なす」：
  - ・使用量「1g/株」／使用時期「育苗期後半」に適用病害虫名「コジラシ類」を追加する。
- ④「キャベツ」：
  - ・使用時期「育苗期後半」に適用病害虫名「ハマダラメカ」／使用量「0.5g/株」を追加する。
  - ・使用時期「定植時」に適用病害虫名「ハマダラメカ」／使用量「1～2g/株」を追加する。

## (5)適用病害虫名、使用時期および使用方法の追加

- ・作物名「かんしょ」に適用病害虫名「アブラムシ類」／使用時期「育苗期」／使用方法「株元処理」を追加する。

## (6)使用量の追加

- ・作物名「きゅうり」／適用病害虫名「コジラシ類」／使用時期「定植時」の使用量「1g/株」を「1～2g/株」に変更する。
- ・作物名「ばら」及び「カーネーション」／適用病害虫名「アブラムシ類」に使用量「6kg/10a」を追加する。

## 【変更部分】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数
さとうきび	ハリガネシ類	4~6kg/10a	植付時	1回	植溝処理 土壌混和	1回
稲	ウカ類 ツマグロヨコバイ	3kg/10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	4回以内 (育苗箱散布は 1回以内、本田 では3回以内)
	カメシ類	3~4kg/10a				
きゅうり	アブラムシ類 コジラミ類 シメキイロアザミウマ	1g/株	育苗期後半	1回	株元処理	4回以内 (育苗期の株元 処理及び定植時 の土壌混和は合 計1回以内、散 布は3回以内)
	アブラムシ類 コジラミ類	1~2g/株	定植時		植穴処理 土壌混和	
	シメキイロアザミウマ	2g/株				
メロン	アブラムシ類 コジラミ類	1g/株	育苗期後半		株元処理	
	コジラミ類	1~2g/株	定植時		植穴処理 土壌混和	
	アブラムシ類					
シメキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	2g/株					
なす	アブラムシ類 コジラミ類	1g/株	育苗期後半	株元処理		
	アブラムシ類 マメハモグリバエ コジラミ類		定植時	植穴処理 土壌混和		
トマト ミニトマト	アブラムシ類、コジラミ類	1~2g/株	鉢上時	株元処理	4回以内(鉢上 時の株元処理、 育苗期後半の 株元処理及び 定植時の土壌 混和は合計1 回以内、散布は 3回以内)	
	アブラムシ類 コジラミ類 マメハモグリバエ		育苗期後半			
	トマトハモグリバエ	2g/株	定植時	植穴処理 土壌混和		

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クチアニジンを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アブラムシ類 ハマダラメカイ	0.25g/株	は種時	1回	覆土後セル成型育苗トレイの上から散布する	3回以内 (は種時の散布、育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
	ネリムシ類、コカガ、アオムシ、アブラムシ類 ハマダラメカイ	0.5g/株	育苗期後半		株元処理	
	アブラムシ類	1g/株	定植時		植穴処理 土壌混和	
	ハマダラメカイ	1~2g/株				
	コカガ、アオムシ	2g/株				
ねぎ (露地栽培)	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	3~6kg/10a	収穫21日前まで	2回以内	株元散布	4回以内 (植付時の植溝処理は1回以内、株元散布は2回以内)
		6kg/10a	植付時	1回	植溝処理	
かんしょ	コガムシ類		育苗期		作条処理 土壌混和	1回
ばら	アブラムシ類		1~2g/株	発生初期	4回以内	
	ミシキイロアザミウマ	2g/株				
カーネーション	アブラムシ類	6kg/10a 1g/株				
げっきつ	ミシキジラミ	30~40g/株				
ブロッコリー	アブラムシ類 ハマダラメカイ	0.25g/株	は種時	1回	覆土後セル成型育苗トレイの上から散布する	4回以内 (は種時の散布、育苗期の株元処理及び定植時の植穴処理土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内)
	アブラムシ類 コカガ アオムシ	0.5g/株	育苗期後半		株元処理	
	アブラムシ類	1g/株	定植時		植穴処理 土壌混和	
	コカガ アオムシ	2g/株				
非結球レタス	アブラムシ類	0.5g/株	育苗期後半		株元処理	3回以内 (育苗期の株元処理は1回以内、散布は2回以内)