

適用拡大登録

| | |
|---------|-----------------|
| 区 分 | 殺菌剤 |
| 農 薬 名 | トレノックスフロアブル |
| 登 録 番 号 | 第 21875 号 |
| 登 録 日 | 平成 22 年 4 月 7 日 |
| <有効成分> | |
| チウラム | 40.0 % |

登録内容

- ・作物名「なし」に「褐色斑点病」を追加する。
- ・作物名「りんどう」に「炭疽病」及び「灰色かび病」を追加する。
- ・作物名「りんどう」の使用時期を「-」から「発病初期」に変更。
- ・作物名「花き類・観葉植物(りんどうを除く)」の適用病害虫名「灰色かび病」を追加。

尚、農薬登録申請書第 8 項「使用上の注意事項」のうち以下の事項を追加する。

(追加)

- ・銅剤との近接散布は葉の汚れを生じるので注意すること。
- ・シクラメンに使用する場合、花卉に薬害が生じるおそれがあるので、花柄伸長期以降は使用しないこと。
- ・適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

(変更後)

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希積倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | チウラムを含む農薬の総使用回数 | | |
|-------------------------------|---|------|------------------|--------------------|---------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| りんご | 斑点落葉病 黒星病 黒点病 褐斑病 すす点病 すす斑病 赤星病 炭疽病 輪紋病 | 500倍 | 200～7000 /10a | 収穫 30日 前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 | | |
| なし | 黒斑病 黒星病 赤星病 心腐れ症 (胴枯病菌) 炭疽病 褐色斑点病 | | | | | | | 5回以内 (休眠期は 1回以内) | |
| もも | 黒星病 灰星病 縮葉病 せん孔細菌病 | | | | | | | | 収穫 7日 前まで |
| ネクタリン | | | | 収穫 30日 前まで | | | 2回以内 | 2回以内 (休眠期は 1回以内) | |
| かき | 落葉病 炭疽病 | | | 収穫 14日 前まで | | | 3回以内 | 3回以内 | |
| すもも | ふくろみ病 炭疽病 | | | 収穫終了 ～落葉期 まで | | | | | 3回以内 |
| おうとう | 褐色せん孔病 炭疽病 | | | 100～5000 /10a | | | 発病初期 | 6回以内 | 6回以内 |
| りんどう | 褐斑病 葉枯病 炭疽病 灰色かび病 | | | | | | | | |
| 花き類・ 観葉植物(り んどうを除 く) | 灰色かび病 | | | | | | | | |