

適用拡大登録

区 分	除 草 剤
農 薬 名	バッチリフロアブル
登 録 番 号	第 22149 号
登 録 日	平成 23 年 8 月 3 日
<有効成分>	
イマゾスルロン	1.7 %
ピラクロニル	3.7 %
プロモブチド	16.3 %

登録内容

- ①作物名「直播水稻」の使用時期『イネ 1 葉期～ノビエ 2.5 葉期ただし、収穫 90 日前まで』を『イネ出芽始期～ノビエ 2.5 葉期ただし、収穫 90 日前まで』に変更する。

【変更後】

7. 適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ (北海道、東北、九州) ミズガヤツリ (北海道を除く) ウリカワ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ (北海道を除く) コウキヤガラ (東北、関東・東山・東海、九州) シズイ(東北) アオト ^ろ ・藻類による表層はく離 (北陸、九州を除く)	移植時	砂壤土～埴土	500ml /10a	1回	田植同時散布機で施用	全域の普通期及び早期栽培地帯
		移植直後～ノビエ 2.5 葉期 ただし、移植後 30 日まで				原液湛水散布又は水口施用	
直播水稲	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ (北海道を除く) ウリカワ ヒルムシロ セリ	イネ出芽始期～ノビエ 2.5 葉期 ただし、収穫 90 日前まで				原液湛水散布	全域

イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数	ピラクロニルを含む農薬の総使用回数	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	2回以内

以上