

## 適用拡大登録

区 分	除 草 剤
農 薬 名	バッチリ 1 キロ粒剤
登 録 番 号	第 22148 号
登 録 日	平成 23 年 8 月 3 日
<有効成分>	
イマゾスルフロン	0.90 %
ピラクロニル	2.0 %
ブロモブチド	9.0 %

## 登録内容

- ①作物名「直播水稻」の使用時期『イネ 1 葉期～ノビエ 2.5 葉期ただし、収穫 90 日前まで』を『イネ出芽始期～ノビエ 2.5 葉期ただし、収穫 90 日前まで』に変更する。
- ②作物名「直播水稻」の適用地帯に『九州』を追加し、『全域（九州を除く）』を『全域』に変更する。
- ③作物名「直播水稻」の適用雑草に『ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ』を追加する。

【変更後】

7. 適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ (北海道、東北) ミズガヤツリ (北海道を除く) ウリカワ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ (北海道を除く) コウキヤガラ (東北、関東・東山・東海、九州) シズイ (東北) アオドロ・藻類による表層はく離 (九州を除く)	移植時	砂壤土～ 埴土	1kg/10a	1回	田植同時 散布機で 施用	全域の 普通期 及び 早期栽培 地帯
		移植直後～ ルビエ2.5葉期 ただし、 移植後30日まで				湛水散布 又は無人 ヘリコプターに よる散布	
直播水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	イネ出芽始期～ ルビエ2.5葉期 ただし、 収穫90日前まで	埴土～ 埴土				全域

イマズスルフロン を含む農薬の 総使用回数	ピラクロニル を含む農薬の 総使用回数	ブロモブチド を含む農薬の 総使用回数
2回以内	2回以内	2回以内

以上