

適用拡大登録

区 分	殺 虫 剤
農 薬 名	協友パダン S G 水溶剤
登 録 番 号	第 21866 号
登 録 日	平成 22 年 5 月 12 日
< 有効成分 >	
カルタップ	75.0 %

登録内容

- ・ 作物名「ほうれんそう」に適用病害虫名「アシグロハモグリバエ」を追加する。
- ・ 作物名「ふき（ふきのとう）」のカルタップを含む農薬の総使用回数を「2回以内」から「4回以内（水溶剤の処理は2回以内、粒剤の処理は2回以内）」に変更する。
- ・ 適用表に「使用液量」欄を設置し、作物名「稲」、使用方法「散布」及び「はとむぎ」については「60～150L/10a」、作物名「キャベツ」、「はくさい」、「だいこん」、「なばな」、「さやえんどう」、「実 えんどう」、「ブロッコリー」、「ほうれんそう」、「チンゲンサイ」、「レタス」、「非結球レタス」、「とうもろこし」、「ばれいしょ」、「ホップ」、「しょうが」、「ガーベラ」、「シクラメン」、「いぐさ」、「ふき」、「ふき（ふきのとう）」、「くわい」、「さやいんげん」、「はつかだいこん」、及び「飼料用とうもろこし」については「100～300L/10a」、作物名「かき」、「くり」、「びわ」、「びわ(葉)」、「ぶどう」及び「キウイフルーツ」については「200～700L/10a」、作物名「茶」については「200～400L/10a」とする。

【追加後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	加トップを含む農薬の総使用回数		
稲	ニカメイトウ コブノメイ イトムシ イトハダク ハエ	1500 倍	60 ~ 150 L/10a	収穫 21 日前 まで	6 回以内	散布	6 回以内(種もみ 浸漬は 1 回以内、 床土への混和 育苗箱への処理 及び側条施用は 合計 1 回以内)		
	イトシガ レンチュウ	1500 ~ 3000 倍	-	浸種前	1 回			24 時間 種もみ 浸漬	
キャベツ	コガ アムシ アブラムシ類 ハマダラメイガ	1500 倍	100 ~ 300 L/10a	収穫 14 日前 まで	4 回以内	散布	4 回以内		
はくさい	コガ アムシ アブラムシ類	1000 倍		収穫 7 日前 まで	3 回以内		3 回以内		
だいこん	ダク イソシクイムシ								
なばな	コガ アブラムシ類	1500 倍		収穫前日 まで	4 回以内			4 回以内	
さやえんどう 実えんどう	ウラナミジミ ハダク ハエ	1500 ~ 3000 倍							
ブロッコリー	コガ	1500 倍		収穫 7 日前 まで	4 回以内			4 回以内	
ほうれんそう	ミナキイロアザミウラ アシガ ロハダク ハエ				2 回以内			2 回以内	
チンゲンサイ	ハダク ハエ類 コガ			3 回以内	3 回以内				
レタス	ナメクジ類			2 回以内	収穫 14 日前 まで			2 回以内	2 回以内
非結球レタス	ハダク ハエ								
かき	チャノホソガ ミウラ ハダク ハエ イラガ ハダク ハエ ラメイガ		1500 ~ 3000 倍	収穫 45 日前 まで	4 回以内	4 回以内			
	ハダク ハエ								
くり	モモコ マダ ラメイガ ネズミ キナガ	1500 倍	裂果前	3 回以内	3 回以内				
びわ びわ(葉)	ナシ メシクイ		200 ~ 700 L/10a	春芽伸長初期 まで 但し、 収穫 90 日前 まで	4 回以内	4 回以内			
ぶどう	チャノホソガ ミウラ フタテヒメコバ イ		5 回以内	収穫 21 日前 まで	5 回以内	5 回以内			
キウイフルーツ	キイロ メシクイ キイロ メシクイ		3 回以内	収穫 30 日前 まで	3 回以内	3 回以内			
茶	チャノホソガ チャノホソガ ミウラ チャノミド ヒメコバ イ		200 ~ 400 L/10a	摘採 10 日前 まで	1 回	1 回			

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	加トップを含む農薬の総使用回数
とうもろこし	アノメイガ	1000 倍	100 ~ 300 L/10a	収穫 21 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
はとむぎ	アノメイガ	1500 倍	60 ~ 150 L/10a				
ばれいしょ	ジヤガ イガ 若齡幼虫		収穫 7 日前まで	6 回以内			
ホップ	フキメイガ			3 回以内			
しょうが	フキメイガ アノメイガ		5 回以内				
ガーベラ	マハモク リハ イ		-	4 回以内			
シクラメン	ミカキバアザ ミマ		発生初期	5 回以内			
いぐさ	イグ サソムシガ		-	3 回以内			
ふき	アザ ミマ類 アノメイガ類 フキメイガ		収穫 7 日前まで	2 回以内	2 回以内		4 回以内 (水溶剤の処理は 2 回以内、 粒剤の処理は 2 回以内)
ふき (ふきのとう)			収穫 120 日前まで				
さといも	ネコノシロ		300 倍	-	植付前	1 回	30 分間 種いも浸漬
くわい	ハシロコ	1500 倍	100 ~ 300 L/10a	収穫 30 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内
さやいんげん	マハモク リハ イ			収穫前日まで			
はつかだいこん	コナガ			収穫 7 日前まで	1 回		
飼料用 とうもろこし	アノメイガ	1000 倍		収穫 21 日前まで	2 回以内		2 回以内

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	加トップを含む農薬の総使用回数
稲	イネノメイガ	100 ~ 200g/10a	移植時	1 回	バースト肥料に溶かし 側条施肥田植機 で施用する。	6 回以内 (種もみ浸漬は 1 回以内、 床土への混和、 育苗箱への処理 及び側条施用は 合計 1 回以内)
	イネノメイガ コナガ ニカメイガ	200g/10a				