

適用拡大登録

区 分	除 草 剤
農 薬 名	ビクトリー Z ジャンボ
登 録 番 号	第 22839 号
登 録 日	平成 23 年 7 月 6 日
<有効成分>	
ピラクロニル	5.0%
プロピリスルホン	2.25%

登録内容

- ・作物名「移植水稻」に適用雑草名「オモダカ（東北・関東・東山・東海、近畿・中国・四国）」、「クログワイ（関東・東山・東海）」、「コウキヤガラ（近畿・中国・四国）」を追加する。
- ・作物名「移植水稻」の適用地帯「北海道」の適用土壌を「壤土～埴土」から「砂壤土～埴土」に変更し、適用地帯「九州の普通期及び早期栽培地帯」の使用時期「移植後 5 日～ノビエ 2.5 葉期 ただし、移植後 30 日まで」を「移植後 5 日～ノビエ 3 葉期 ただし、移植後 30 日まで」に変更して、使用時期「移植後 5 日～ノビエ 3 葉期 ただし、移植後 30 日まで」、適用土壌「砂壤土～埴土」、適用地帯「全域の普通期及び早期栽培地帯」とする。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ (北海道、東北) ミズガヤツリ (北海道を除く) ウリカワ ヒルムシロ セリ オモダカ (東北、関東・東山・東海、近畿・中国・四国) クログワイ (関東・東山・東海) コウキヤガラ (近畿・中国・四国) アオミドロ・藻類による表層はく離 (北陸、関東・東山・東海、近畿・中国・四国)	移植後 5 日～ ノヒエ 3 葉期 ただし、移植後 30 日まで	砂壤土 ～埴土	小包装 (ハック) 10 個 (400g) /10a	1 回	水田に 小包装(ハック)のまま投げ入れる。	全域の普通 期及び早期 栽培地帯

ピラクロニルを含む農薬の総使用回数	プロピリスルフロンを含む農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内