

適用拡大登録

区 分	除 草 剤
農 薬 名	ビクトリー Z フロアブル
登 録 番 号	第 22841 号
登 録 日	平成 23 年 9 月 7 日
<有効成分>	
ピラクロニル	3.9%
プロピリスルホン	1.7%

登録内容

- ・作物名「移植水稻」の適用雑草名「オモダカ（北海道、東北、北陸、近畿・中国・四国）」に適用地帯「関東・東山・東海」を追加し、「オモダカ（九州を除く）」に変更する。
- ・作物名「移植水稻」の適用地帯「北海道」の適用土壌を「壤土～埴土」から「砂壤土～埴土」に変更し、適用地帯「九州の普通期及び早期栽培地帯」の使用時期「移植後 5 日～ノビエ 2.5 葉期 ただし、移植後 30 日まで」を「移植後 5 日～ノビエ 3 葉期 ただし、移植後 30 日まで」に変更して、使用時期「移植後 5 日～ノビエ 3 葉期 ただし、移植後 30 日まで」、適用土壌「砂壤土～埴土」、適用地帯「全域の普通期及び早期栽培地帯」とする。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草 及 び マ ツ バ イ ホ タ ル イ ウ リ カ ワ ミズガヤツリ (北海道を除く) ヘラオモダカ (北海道、東北) ヒ ル ム シ ロ セ リ エリノサヤヌカグサ (北海道) シ ズ イ (東北) オモダカ (九州除く) クログワイ (北陸、近畿・中 国・四国) コウキヤガラ (東北、関東・東 山・東海、九州) アオミドロ・ 藻類による 表層はく離 (関東・東山・東 海、近畿・中国・ 四国、九州)	移植後 5 日～ ルビエ 3 葉期 ただし、 移植後 30 日 ま で	砂壤土 ～ 埴土	500mL /10a	1 回	原液 湛水 散布	全域の普通期 及び早期栽培 地 帯

ピラクロニルを 含む農薬の総使用回数	プロピリスルフロンを 含む農薬の総使用回数
2 回 以 内	2 回 以 内