

## 適用拡大登録

区 分	除 草 剤
農 薬 名	ビクトリー Z1 キロ粒剤
登 録 番 号	第 22843 号
登 録 日	平成 23 年 7 月 20 日
<有効成分>	
ピラクロニル	2.0%
プロピリスフロロン	0.90%

## 登録内容

- ・作物名「移植水稻」の適用雑草名「オモダカ（北海道）」に適用地帯「東北、関東・東山・東海、九州」を追加し、「オモダカ（北陸、近畿・中国・四国を除く）」に変更する。
- ・作物名「移植水稻」に適用雑草名「クログワイ（東北、関東・東山・東海、九州）」、「コウキヤガラ（関東・東山・東海）」を追加する。
- ・作物名「移植水稻」に適用雑草名「ヒルムシロ（北陸を除く）」の適用地帯に「北陸」を追加する。
- ・作物名「移植水稻」に使用時期「移植時」、使用方法「田植同時散布機で施用」、適用地帯「東北、北陸、関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯」を追加する。
- ・作物名「移植水稻」の適用地帯「東北、北陸、関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯」の使用時期を「移植後 5 日～ノビエ 3 葉期 ただし、移植後 30 日まで」から「移植直後～ノビエ 3 葉期 ただし、移植後 30 日まで」に変更する。
- ・作物名「移植水稻」の適用地帯「北海道」の適用土壌を「壤土～埴土」から「砂壤土～埴土」に変更し、適用地帯「九州の普通期及び早期栽培地帯」の使用時期「移植後 5 日～ノビエ 2.5 葉期 ただし、移植後 30 日まで」を「移植後 5 日～ノビエ 3 葉期 ただし、移植後 30 日まで」に変更して、使用時期「移植後 5 日～ノビエ 3 葉期 ただし、移植後 30 日まで」、適用土壌「砂壤土～埴土」、適用地帯「北海道、近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯」とする。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ	移植時	砂壤土 ～ 埴土	1kg /10a	1 回	田植 同時 散布 機で 施用	東北、北陸、 関東・東山・東 海の普通期及 び早期栽培地 帯
	ミズガヤツリ (北海道を除く) ヘラオモダカ (北海道、東北) ヒルムシロ セリ エゾノサヤヌカグサ (北海道) オモダカ (北陸、近畿・中 国・四国を除く)	移植直後～ ルビエ 3 葉期 ただし、 移植後 30 日 まで				湛水 散布	
	クログワイ (東北、関東・東 山・東海、九州) コウキヤガラ (関東・東山・東 海) アオミドロ・ 藻類による 表層はく離 (北海道、東北を除 く)	移植後 5 日～ ルビエ 3 葉期 ただし、 移植後 30 日 まで					

ピラクロニルを 含む農薬の総使用回数	プロピリスルフロンを 含む農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内