

適用拡大登録

区 分	殺菌剤
農 薬 名	ラビキラー乳剤
登 録 番 号	第 15803 号
登 録 日	平成 19 年 11 月 28 日
<有効成分>	
MEP	40.0 %
PAP	10.0 %

適用拡大登録内容

負の拡大となります。

- * 作物名「りんご」の本剤の使用回数「2回以内」及び PAP を含む農薬の総使用回数「4回以内」を「1回」に変更する。
- * 作物名「みかん」の PAP を含む農薬の総使用回数「5回以内（200倍希釈散布は2回以内）」を「2回以内」に変更する。

【変更部分の内容】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEP を含む農薬の総使用回数	PAP を含む農薬の総使用回数
みかん	ゴマカシカキリ	200倍	産卵初期～ 幼虫食入初期 但し、収穫 14日前まで	2回 以内	樹幹部から 地際部へ 散布する。	5回以内	2回以内
りんご			産卵初期～ 産卵最盛期 但し、収穫 30日前まで	1回		3回以内	1回

注意事項の追加

以下の注意事項を追加する。

- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
 - ①ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
 - ②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。
 - ③養蜂が行われている地区では周辺への飛散に注意する等、ミツバチの危害防止に努める。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。