

適用拡大登録

区 分	除 草 剤
農 薬 名	協友サンシャインフロアブル
登 録 番 号	第 22254 号
登 録 日	平成 23 年 7 月 20 日
<有効成分>	
ピラクロニル	3.9 %
ベンゾビスクロン	3.9 %

登録内容

- ① 適用地帯「九州」の適用土壌「壤土～埴土」に使用時期「移植直後」を追加し、「移植直後～ノビエ2葉期ただし、移植後30日まで」とする。
- ② 使用時期「移植時」の適用土壌「壤土～埴土」に適用地帯「九州の普通期及び早期栽培地帯」を追加し、「北海道、九州の普通期及び早期栽培地帯」とする。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ (北海道を除く) ヘラオモダカ (北海道、東北) ヒルムシロ クログワイ(東北、 関東・東山・東海、 近畿・中国・四国) オモダカ(東北、関 東・東山・東海) コウキヤガラ (関東・東山・東海、 九州) シズイ(東北)	移植後3日～ ノビエ2葉期 ただし、移植後 30日まで	砂壤土	500 ml/10a	1回	原液湛水散布	北海道、九州 の普通期及び 早期栽培地帯
		移植直後～ ノビエ2葉期 ただし、移植後 30日まで	壤土～埴土				全域(北海道、 九州を除く) の普通期及び 早期栽培地帯
			砂壤土～ 埴土				北海道、九州 の普通期及び 早期栽培地帯
		移植時	壤土～埴土				北海道、九州 の普通期及び 早期栽培地帯
			砂壤土～ 埴土				全域(北海道、 九州を除く) の普通期及び 早期栽培地帯

ピラクロニルを含む 農薬の総使用回数	ベンゾビスクロンを含む 農薬の総使用回数
2回以内	2回以内