

適用拡大登録

区 分	除草剤
農 薬 名	協友草笛フロアブル
登 録 番 号	第 21621 号
登 録 日	平成 23 年 7 月 20 日
<有効成分>	
クミロン	27.4%
ペントキサゾン	8.2%

登録内容

- ・使用量「300mL/10a（少量散布）」の使用時期に「移植時」を追加し、使用方法に「田植同時散布機で施用」を追加する。

(変更後)

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ヘラオモダカ (北海道、東北)	移植時	砂壤土 ～埴土	500ml ／10a	1回	田植同時散布機で施用	全域の普通期及び早期栽培地帯
		植代時～移植前4日 又は 移植直後～ L^{E} 1葉期 (近畿・中国・四国、九州は L^{E} 発生始期まで) 但し、移植後30日まで				原液湛水散布	
	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ (北海道を除く) コウキヤガラ (関東・東山・東海、九州) クログワイ (北海道を除く) シズイ (東北)	移植時		300ml ／10a (少量散布)		田植同時散布機で施用	北海道
		移植直後～ L^{E} 1葉期 但し、移植後30日まで				原液湛水散布	全域(北海道を除く)の普通期及び早期栽培地帯
植代後～移植前4日 又は 移植直後～ L^{E} 1葉期 但し、移植後30日まで							

クミルロンを含む 農薬の総使用回数	ヘントキサゾンを含む 農薬の総使用回数
2回以内	2回以内