

適用拡大登録

区 分	除草剤
農 薬 名	協友草笛フロアブル
登 録 番 号	第 21621 号
登 録 日	平成 21 年 9 月 15 日
<有効成分>	
クミロン	27.4%
ハントキサゾン	8.2%

登録内容

作物名「移植水稻」の使用量「300ml/10a(少量散布)」の適用雑草名に「シズイ(東北)」を追加する。

作物名「移植水稻」の適用地帯「全域の普通期及び早期栽培地帯」の使用時期及び使用方法に「移植時」、「田植同時散布機で施用」を追加する。

(変更後)

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ、 ヘラオモダカ (北海道、東北)	移植時	砂壤土 ～ 埴土	500ml / 10a	1 回	田植同時 散布機で 施用	全域の普通期及び 早期栽培 地帯
		植代時～移植前 4 日 又は 移植直後～ル・I 1 葉期 (近畿・中国・四国、 九州はノビエ発生 始期まで) 但し、移植後 30 日まで				原液湛水 散布	北海道
	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ (北海道を除く) コウキヤガラ (関東・東山・東海、 九州) クログワイ (北海道を除く) シズイ(東北)	移植直後～ル・I 1 葉期 但し、移植後 30 日まで		植代後～移植前 4 日 又は 移植直後～ル・I 1 葉期 但し、移植後 30 日まで		300ml / 10a (少量 散布)	全域(北海道を除く)の 普通期 及び 早期栽培 地帯

クミロンを含む 農薬の総使用回数	ハントキサゾンを含む 農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内