

適用拡大登録

区 分	除草剤
農 薬 名	協友農将軍フロアブル
登 録 番 号	第 21587 号
登 録 日	平成 23 年 7 月 20 日
<有効成分>	
ジメタメトリン	0.50%
ピリブチカルブ	10.0%
プレチラクロール	5.0%

登録内容

使用量 300ml/10a（少量散布）に使用時期「移植時」、使用方法「田植同時散布機で施用」
適用地帯「全域（近畿・中国・四国、九州を除く）の普通期及び早期栽培地帯」を追加する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植 水 稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ (北海道、東北) アオミドロ・ 藻類による表層 はく離 (北海道、東北、 北陸、関東・東山 ・東海)	移植時	砂壤土～ 埴土	500ml /10a	1 回	田植 同時 散布機 で施用	全域（北海道、九州を除く）の普通期及び早期栽培地帯
			壤土～ 埴土				北海道、九州の普通期及び早期栽培地帯
		移植直後～ ル ¹ 葉期 但し、 移植後 30 日まで	壤土～ 埴土			北海道	
		移植直後～ ル ^{1.5} 葉期 但し、 移植後 30 日まで	砂壤土～ 埴土			東北、北陸	
		植代後～移植 4 日 前まで、移植直後～ ル ^{1.5} 葉期 但し、 移植後 30 日まで				関東・東山・ 東海の普通期及 び早期栽培地帯	
		移植直後～ ル ¹ 葉期 但し、 移植後 30 日まで	壤土～ 埴土			近畿・中国・ 四国の普通期及 び早期栽培地帯 九州の普通期及 び早期栽培地帯 北海道	
	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ (北海道、東北) アオミドロ・ 藻類による表層 はく離 (北海道、関東・ 東山・東海)	植代後～移植 4 日 前まで、移植直後～ ル ¹ 葉期 但し、 移植後 30 日まで	砂壤土～ 埴土	300ml /10a (少量 散布)		水口 施用	東北、北陸、 関東・東山・東海 の普通期及び早 期栽培地帯
		移植直後～ ル ¹ 葉期 但し、 移植後 30 日まで					東北
		移植時	砂壤土～ 埴土	300ml /10a (少量 散布)		田植 同時 散布機 で施用	全域（近畿・中国・四国、九州を除く）の普通期及び早期栽培地帯

ジメタトリンを含む農薬の 総使用回数	ピリプロチアルブを含む農薬の総 使用回数	プレチアコロールを含む農薬の総 使用回数
2 回以内	2 回以内	2 回以内