

平成20年9月吉日

各 位

協友アグリ株式会社
開発普及部

種子消毒用微生物防除剤

「タフブロック」適用拡大のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成20年9月10日付にて、水稲用の微生物農薬「タフブロック(農林水産省登録第21920号)」が下記の通り、適用拡大となりましたのでご連絡致します。

タフブロックは、水稲の育苗場面における重要な種子感染病害「いもち病、ばか苗、苗立枯細菌病、もみ枯細菌病、褐条病」に加え、土壌感染病害「苗立枯病(リゾープス菌)、苗立枯病(フザリウム菌)」に対して、種子消毒処理により、高い予防効果を示します。化学農薬としてカウントされない微生物防除剤ですので、特別栽培や環境保全型農業に最適です。

今後とも、本剤の普及推進へのご協力と、適正使用に関してのご指導を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

『タフブロック』 適用拡大内容(平成20年9月10日付)

追加事項

- ・適用病害虫名「苗立枯病(リゾープス菌)、苗立枯病(フザリウム菌)」を追加
- ・適用病害虫名「ばか苗病、いもち病、苗立枯細菌病、もみ枯細菌病」に処理方法「催芽前 20 倍 1 時間種子浸漬」を追加

以上

『タフブロック』適用拡大内容(農林水産省登録:第21920号)

1. 適用拡大日 平成20年9月10日

2. (新)適用病害虫の範囲および使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	タロマイセスフラバスを含む農薬の総使用回数
稲	褐条病	200倍	催芽時	-	24時間 種子浸漬	-
	ばか苗病		催芽前		24～48時間 種子浸漬	
	いもち病					
	苗立枯細菌病	種子重量 の4%	浸種前		湿粉衣	
	もみ枯細菌病					
	<u>苗立枯病</u> <u>(フザリウム菌)</u>					
<u>苗立枯病</u> <u>(リゾープス菌)</u>						
稲	ばか苗病	20倍	浸種前～ <u>催芽前</u>	-	1時間 種子浸漬	-
	いもち病					
	苗立枯細菌病	浸種前				
	もみ枯細菌病					
<u>苗立枯病</u> <u>(フザリウム菌)</u>						
<u>苗立枯病</u> <u>(リゾープス菌)</u>						
稲 (箱育苗)	<u>苗立枯病</u> <u>(リゾープス菌)</u>	<u>200倍</u>	<u>は種時</u> <u>覆土前</u>		<u>育苗箱</u> <u>(30×60×3cm、</u> <u>使用土壌約5ℓ)</u> <u>1箱当り希釈液</u> <u>200mlを土壌灌注</u> <u>する。</u>	

※ 太字・下線部が今回の適用拡大内容

3. 使用上の注意事項

※今回の適用拡大に係る変更はありません

- (1) 本剤の有効成分は生菌であるので、薬液調製後はできるだけ速やかに使用すること。また、開封後は密封して保管し、できるだけ早く使い切ること。
- (2) 種籾と処理薬液の容量比は1:1以上とし、種籾は目の粗い網袋などを用い、薬液処理時によくゆすること。
- (3) 本剤は他剤と混用すると十分に効果が発揮されない場合があるので注意すること。
- (4) 処理後の種籾乾燥の際は、直射日光や極端な高温を避けること。
- (5) 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所などの関係機関の指導を受けることが望ましい。

以上