

平成20年1月22日

お客様 各位

協友アグリ株式会社

## 果樹用殺菌剤「トレノックスフロアブル」上市のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のことと大慶に存じます。平素より弊社製品に対し、格別のご指導・ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「トレノックスフロアブル」は、長年ご愛顧いただきました「ダイボルトフロアブル」の後継剤として開発を進め、平成19年1月24日に登録を取得いたしました。

その後、適用拡大を進め、広くご使用頂ける現在の登録内容(別紙参照)となった事に伴い、このたび上市の運びとなりました。

本剤は、「ダイボルトフロアブル」に比べ成分数が半減し、収穫前日数も短縮されるなど、大変使い易くなっております。今後は更に、「ダイボルトフロアブル」以上の登録内容となるよう適用拡大を進めてまいります。

何卒、トレノックスフロアブルの普及拡大にご尽力を賜りますようお願い申し上げます。

尚、ダイボルトフロアブルにつきましても当面供給を継続させていただきます。

謹白

### 記

#### 1. 発売予定

平成20年2月

#### 2. 登録内容

- ・ 商品名：トレノックスフロアブル
- ・ 登録番号：第21875号
- ・ 有効成分の種類及び含有量：  
チウラム・・・ビス（ジメチルチオカルバモイル）ジスルフィド 40.0%
- ・ 特長及び適用病害・使用方法： 別紙

以上

1 成分で同時防除が可能な予防殺菌剤

# トレノックス® フロアブル

チウラム・・・40.0%

「トレノックス」は協友アグリ株式会社の登録商標です。

## 特 徴

- チウラムは保護殺菌剤で、予防効果に優れています。
- 従来のジラム・チウラム剤に比べ成分数が、1 成分に低減されました。  
また、各作物の収穫前日数が短縮されました。
- 抗菌スペクトラムが広く、同時防除が可能です。
- 耐性菌の発生の心配が少ない薬剤です。

### 【適用作物・病害】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	チウラムを含む農業 の総使用回数
りんご	斑点落葉病 黒星病 黒点病 褐斑病 すす点病 すす斑病 赤星病 炭疽病	500倍	200～700L/ 10a	収穫 30日前 まで	5回以内	散布	5回以内
なし	黒斑病 黒星病 赤星病 心腐症 (胴枯病菌)						
もも	黒星病 灰星病 縮葉病			収穫 7日前 まで	5回以内		
かき	落葉病 炭疽病			収穫30日前 まで	2回以内		2回以内 (休眠期は1回以内)
すもも	ふくろみ病			発芽前	1回		1回
ネクタリン	黒星病 灰星病 縮葉病			収穫 30日前 まで	5回以内		5回以内
おうとう	褐色せん孔病 炭疽病			収穫終了～ 落葉期まで	3回以内		3回以内

### 【適用拡大予定】

りんご「輪紋病」、なし「炭疽病」、もも・ネクタリン「せん孔細菌病」、すもも「炭疽病」及び  
りんどう「葉枯病」、「褐斑病」

### 【注意事項】

- 石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用はさけてください。
- 蚕に対して毒性があるので、桑葉にかからないように注意して散布してください。
- 魚毒性が強いので(C 類相当)、河川に流入しないよう注意してください。