

殺虫剤

ディアナ[®] SC

スピネトラム……………11.7%

種類名／スピネトラム水和剤

登録番号／第22910号

(住友化学登録)

毒性／普通物*

有効年限／3年

包装／100ml×10×2

特 長

- 幅広い殺虫スペクトラムを示します。
 チョウ目はもちろん、アザミウマ目害虫・ハエ目害虫・コナジラミ類に対しても防除効果を発揮しますので、幅広い害虫の防除が可能です。
- 速やかな食害抑制効果を示します。
 チョウ目害虫に対して、速やかな摂食阻害活性を發揮しますので、被害の拡大（進展）を抑制します。
- 茶のハマキムシ類に優れた効果を示します。
 各ステージ(卵・幼虫・成虫)に高い効果を示しますので、散布適期が広く使いやすい薬剤です。
- 収穫前日まで使用が可能です。(茶のみ摘採7日前まで)

適用害虫と使用方法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。


作物名	適用害虫名	希釈倍数	10a 当り 使用液量	使用時期	総使用 回数*	使用方法
ト マ ト ミニトマト	アザミウマ類 コナジラミ類	2500倍	100～300 l	収穫前日 まで	2回	散布
	ハモグリバエ類 ハスモンヨトウ オオタバコガ	2500～ 5000倍				
な す	コナジラミ類 アザミウマ類 ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 オオタバコガ	2500倍				
キャベツ	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ アザミウマ類 ウババコガ オオタバコガ	2500～ 5000倍				

(つづく)


作物名	適用害虫名	希釈倍数	10a 当り 使用液量	使用時期	総使用 回数*	使用方法
ね ぎ	アザミウマ類 シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ	2500～ 5000倍	100～300 ℓ	収穫前日 まで	2回	散布
レ タ ス 非結球レタス	ハモグリバエ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ					
い ち ご	アザミウマ類 ハスモンヨトウ					
茶	チャノキイロアザミウマ チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャハマキ ヨモギエダシャク チャトゲコナジラミ		200～400 ℓ	摘採 7日前まで	1回	
きく	アザミウマ類 オオタバコガ ハモグリバエ類		100～300 ℓ	発生初期	2回	
花き類・ 観葉植物 (きくを除く)	オオタバコガ ハモグリバエ類					

使用にあたって


使用上の注意

- 使用前によく振ってから使用してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法にあわせて調節してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
-  ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ①ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - ②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用を避けてください。
 - ③養蜂が行われている地区では周辺への飛散に注意する等、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

蚕 毒

-  蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。桑葉にかかった場合には使用後約1ヶ月間は蚕に給餌しないでください。

安全使用上の注意

-  本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。

- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

貯蔵上の注意

- 密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。