

## 殺虫殺菌剤

### ブラシダントツ<sup>®</sup>H粉剤DL

|         |      |
|---------|------|
| クロチアニジン | 0.5% |
| フェリムゾン  | 2.0% |
| フサライド   | 1.5% |

種類名/クロチアニジン・フェリムゾン・フサライド粉剤  
 農林水産省登録/第21218号(住友化学登録)  
 毒性/普通物\*  
 有効年限/5年  
 包装/3kg×8

## 特 長

- 主要なカメムシ類に対して優れた効果。
  - ・有効成分(クロチアニジン)含量が高く、アカヒゲホソミドリカスミカメ、オオトゲシラホシカメムシ、クモヘリカメムシなど幅広いカメムシに適確な効果と残効性を発揮します。
- 水稻の主要害虫ともいもち病にも優れた効果。
  - ・ウンカ類、ツマグロヨコバイ、ニカメイチュウ、フタオビコヤガ、イネツトムシや、いもち病などに対しても高い効果を発揮します。

## 適用病害虫と使用方法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

| 作物名 | 適用病害虫名  | 10a当り使用量 | 使用時期        | 総使用回数*  | 使用方法 |
|-----|---|----------|-------------|---|------|
| 稲   | カメムシ類<br>ウンカ類<br>ツマグロヨコバイ<br>ニカメイチュウ<br>フタオビコヤガ<br>イネツトムシ<br>いもち病<br>ごま葉枯病<br>穂枯れ<br>(ごま葉枯病菌) | 3～4kg    | 収穫7日前<br>まで | 本剤 2回<br>クロチアニジン剤 4回<br>[ 直播でのほ種時又は移植時までの処理は1回、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回 ]<br>フェリムゾン剤 2回<br>フサライド剤 3回 | 散布   |

## 使用にあたって

### ■使用上の注意

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼって散布してください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
  - ①ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。
  - ②関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- マルハナバチに影響を及ぼすおそれがあるので注意してください。
- 使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

### ■薬 害

- たばこ、けいとう、幼植物のだいず・あずき・いんげんまめには、かからないように注意して散布してください。

### ■蚕 毒

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。

### ■水産動植物への注意

- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。

#### ■安全使用上の注意

- 眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。(弱い刺激性)
- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。  
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

#### ■貯蔵上の注意

- 密封し、直射日光をさけ、食品と区別してなるべく低温で乾燥した場所に保管してください。

本資料の記載内容は2025年10月15日現在の登録内容に基づいています。