

殺虫殺菌剤

ブラシダントツ[®]H粉剤DL

クロチアニジン	0.5%
フェリムゾン	2.0%
フサライド	1.5%

種類名／クロチアニジン・フェリムゾン・フサライド粉剤
農林水産省登録／第21218号(住友化学登録)
毒性／普通物*
有効年限／5年
包装／3kg×8

特 長

- 主要なカメムシ類に対して優れた効果。
 - ・有効成分(クロチアニジン)含量が高く、アカヒゲホソミドリカスミカメ、オオトゲシラホシカメムシ、クモヘリカメムシなど幅広いカメムシに適確な効果と残効性を発揮します。
- 水稻の主要害虫といもち病にも優れた効果。
 - ・ウンカ類、ツマグロヨコバイ、ニカメイチュウ、フタオビコヤガ、イネツトムシや、いもち病などに對しても高い効果を発揮します。

適用病害虫と使用法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用病害虫名	10a当り使用量	使用時期	総使用回数*	使用方法
稲	カメムシ類 ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ イネツトムシ いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌)	3～4kg	収穫7日前 まで	本剤 クロチアニジン剤 2回 4回 「直播では種時又は移植 時までの処理は1回、本田 での散布、空中散布、無 人ヘリ散布は合計3回」 フェリムゾン剤 2回 フサライド剤 3回	散布



使用者への被害防止方法(散布)
稲：不浸透性手袋



使用にあたって

■使用上の注意

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼって散布してください。
- マルハナバチに影響を及ぼすおそれがあるので注意してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

■薬 害

- たばこ、けいとう、幼植物のだいず・あずき・いんげんまめには、かからないように注意して散布してください。

■蚕 毒



- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。

■生活環境動植物への注意

- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。

■安全使用上の注意

【ミツバチに係る注意事項】



- ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。

- 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。

■貯蔵上の注意

- 密封し、直射日光をさけ、食品と区別してなるべく低温で乾燥した場所に保管してください。

本資料の記載内容は2026年7月22日現在の登録内容に基づいています。