

アシエラ

水稲用一発処理除草剤



1キロ粒剤 フロアブル ジャンボ 400FG

NEW

®は協友アグリ(株)の登録商標です。

急ぐことなし! まだ間に合う!
4葉期までの大きなノビエも枯らす!

ノビエ
4葉期まで

ホタルイ
花茎10cmまで

クログワイ
草丈20cmまで

オモダカ
矢じり葉 3葉期まで

コウキヤガラ
草丈30cmまで

イボクサ
草丈10cmまで

水稲用一発処理除草剤



1キロ粒剤
フロアブル
ジャンボ
400FG

特長

ノビエの4葉期、葉齢の進んだオモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、イボクサにも優れた効果

- ノビエの4葉期まで枯らし、後発のノビエの発生も長く抑制します。
- 葉齢が進んだ多年生雑草(オモダカ矢じり葉3葉、クログワイ草丈20cm、コウキヤガラ草丈30cmまで)に高い効果を示します。
- SU抵抗性雑草(ホタルイ、コナギ、オモダカ等)に優れた効果を発揮します。
- 田植同時処理や移植直後の処理に加えて、遅めの散布にも適しています。

適用雑草の範囲及び使用方法

アシュラ1キロ粒剤

■有効成分(一般名) ビラクロニル：2.0% トリアファモン：0.5% ベンゾビシクロン：2.0% ■人畜毒性：普通物 * 毒物及び劇物に該当しないものを指している総称 ■農林水産登録 第24322号

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	総使用回数	使用方法	雑草名	散布適期
移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、多年生イネ科雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	移植時	1kg/10a	本剤 ビラクロニル剤 1回 トリアファモン剤 2回 ベンゾビシクロン剤 3回	田植同時散布機で施用	ノビエ、ヘラオモダカ	4葉期まで
		移植直後～ノビエ4葉期 但し、移植後30日まで			湛水散布又は無人航空機による散布	ホタルイ	花茎10cmまで
直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ	稲1葉期～ノビエ4葉期 但し、収穫90日前まで				ウリカワ	5葉期まで
						ヒルムシロ	発生期まで
						セリ	再生期まで
						オモダカ	矢じり葉3葉期まで
						クログワイ	草丈20cmまで
						ミズガヤツリ、コウキヤガラ	草丈30cmまで
						エゾノサヤヌカサ	2葉期まで
						キシュウズズメノヒエ	再生茎3葉期まで
						アオミドロ・藻類による表層はく離	発生前から発生始期まで

アシュラフロアブル

■有効成分(一般名) ビラクロニル：3.8% トリアファモン：0.96% ベンゾビシクロン：3.8% ■人畜毒性：普通物 * 毒物及び劇物に該当しないものを指している総称 ■農林水産登録 第24147号

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	総使用回数	使用方法	雑草名	散布適期
移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、多年生イネ科雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	移植時	500mℓ/10a	本剤 ビラクロニル剤 1回 トリアファモン剤 2回 ベンゾビシクロン剤 3回	田植同時散布機で施用	ノビエ、ヘラオモダカ、ウリカワ	4葉期まで
		移植直後～ノビエ4葉期 但し、移植後30日まで			原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	ホタルイ	花茎10cmまで
直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ	稲1葉期～ノビエ4葉期 但し、収穫90日前まで				ミズガヤツリ、コウキヤガラ	草丈30cmまで
						ヒルムシロ	発生期まで
						セリ	再生期まで
						オモダカ	矢じり葉3葉期まで
						クログワイ	草丈20cmまで
						エゾノサヤヌカサ	2葉期まで
						キシュウズズメノヒエ	再生茎3葉期まで
						アオミドロ・藻類による表層はく離	発生前まで

アシュラジャンボ

■有効成分(一般名) ビラクロニル：5.0% トリアファモン：1.25% ベンゾビシクロン：5.0% ■人畜毒性：普通物 * 毒物及び劇物に該当しないものを指している総称 ■農林水産登録 第24320号

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	総使用回数	使用方法	雑草名	散布適期
移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、多年生イネ科雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	移植直後～ノビエ4葉期 但し、移植後30日まで	小包装(パック) 10個(400g)/10a	本剤 ビラクロニル剤 1回 トリアファモン剤 2回 ベンゾビシクロン剤 3回	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる	ノビエ、ヘラオモダカ	4葉期まで
		稲1葉期～ノビエ4葉期 但し、収穫90日前まで				ホタルイ	花茎10cmまで
直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ	稲1葉期～ノビエ4葉期 但し、収穫90日前まで				ウリカワ	5葉期まで
						ミズガヤツリ、コウキヤガラ	草丈30cmまで
						ヒルムシロ	発生期まで
						セリ	再生期まで
						オモダカ	矢じり葉3葉期まで
						クログワイ	草丈20cmまで
						エゾノサヤヌカサ	2葉期まで
						キシュウズズメノヒエ	再生茎3葉期まで
						アオミドロ・藻類による表層はく離	発生前まで

アシュラ400FG

■有効成分(一般名) ビラクロニル：5.0% トリアファモン：1.25% ベンゾビシクロン：5.0% ■人畜毒性：普通物 * 毒物及び劇物に該当しないものを指している総称 ■農林水産登録 第24321号

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	総使用回数	使用方法	雑草名	散布適期
移植水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、多年生イネ科雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	移植直後～ノビエ4葉期 但し、移植後30日まで	400g/10a	本剤 ビラクロニル剤 1回 トリアファモン剤 2回 ベンゾビシクロン剤 3回	湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布	ノビエ、ヘラオモダカ	4葉期まで
		稲1葉期～ノビエ4葉期 但し、収穫90日前まで				ホタルイ	花茎10cmまで
直播水稲	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ	稲1葉期～ノビエ4葉期 但し、収穫90日前まで				ウリカワ	5葉期まで
						ミズガヤツリ、コウキヤガラ	草丈30cmまで
						ヒルムシロ	発生期まで
						セリ	再生期まで
						オモダカ	矢じり葉3葉期まで
						クログワイ	草丈20cmまで
						エゾノサヤヌカサ	2葉期まで
						キシュウズズメノヒエ	再生茎3葉期まで
						アオミドロ・藻類による表層はく離	発生前まで

使用上の注意事項(抜粋)

■4製剤に共通する注意事項

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの4葉期までに時期を失しないように使用してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にブレが出るので、必ず適期に使用するようにしてください。
- 著しい降雨が予想される場合には除草効果が低下するおそれがあるので散布を控えてください。
- 軟弱な苗を移植した水田、極端な浅植をした水田、極端な深水となった水田及び砂壌土で漏水の大きな水田(減水深2cm/日)以上では、薬害を生じるおそれがあるので使用しないでください。
- 本剤は、その殺草特性から、いくさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は、十分注意してください。
- いくさ栽培予定の水田では使用しないでください。
- 薬害を生じるおそれがあるので、後作物としてす、たまねぎ及びさやえんどうを栽培しないでください。
- 本剤を使用した水田の田面水は、他作物の灌水に用いしないでください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考に使用してください。特に初めて使用する場合は異常気象の場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 壟に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋・空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 密封・密栓し、直射日光を避け、食品と区別して、子供の手のとどかないなるべく低温で乾燥した場所に保管してください。

■1キロ粒剤・フロアブル・FGに共通する注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使い切ってください。
- 1キロ粒剤・ジャンボ・FGに共通する注意事項
- 浅植後、浮き苗が生じないように、代かき、均平作業及び植え付けはいいに行ってください。未熟有機物を施用した場合は、特にいいに行ってください。
- 1キロ粒剤・フロアブルに共通する注意事項
- 散布に当たっては、水の出入りを止め湛水状態(3～5cm)で均一に散布してください。本剤散布後、少なくとも3～4日間は通常の湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。

■1キロ粒剤・FGに共通する注意事項

- 本剤は直ちに刺激性があるので、眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の指導を受けてください。

- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。

■ジャンボ・FGに共通する注意事項

- 散布に当たっては、水の出入りを止め5～6cmの湛水状態を保ってください。本剤散布後、少なくとも3～4日間は通常の湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 1キロ粒剤の注意事項
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落してください。

■フロアブルの注意事項

- 使用前に容器を軽く振ってください。
- 苗の植え付けが均一になるよう、代かき、均平化及び植え付け作業はいいに行ってください。未熟有機物を施用した場合は、特にいいに行ってください。
- 水口施用の場合は、入水時に本剤を水口に施用し、流入水とともに水田全面に拡散させ、処理後田面水が通常の湛水状態(湛水深3～5cm)に達したときに必ず水を止め、田面水があふれ出ないように注意してください。
- 無人航空機による滴下で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。

■ジャンボの注意事項

- 本剤は小包装(パック)のまま、10アル当たり10個の割合で水田に投入してください。

- バックに使用しているフィルムは水溶性なので、濡れた手で作業したり、降雨で破綻することがないようにしてください。
- 藻や浮き草が多発している水田では、拡散が不十分となり部分的な薬害や効果不足を生じることがあるので使用を控えてください。
- 水溶性フィルム包装が破綻した場合は以下の点に注意してください。
- (1)眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の指導を受けてください。(2)皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすようにしてください。
- 水溶性フィルムは吸水性があるので、湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を固く閉じて保管してください。また、強く加圧されると水溶性フィルムが劣化するおそれがあるので下積みにならないようにしてください。
- FGの注意事項
- 藻や浮き草が多発している水田では、拡散が不十分となり部分的な薬害や効果不足を生じることがあるので使用を控えてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、散布の際は手袋、長スポン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすようにしてください。

本資料の記載内容は2023年6月現在の登録内容に基づいています。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 空袋・空容器は圃場などに放置せず、適切に処理してください。