

殺虫剤

協友

ダントツ[®]H粉剤DL

クロチアニジン.....0.5%

種類名／クロチアニジン粉剤
農林水産省登録／第21627号
毒性／普通物*
有効年限／5年
包装／3kg×8

特 長

- 高含量化製剤により効力がアップ
従来のダントツ粉剤DLに比べ有効成分のクロチアニジン含量を高めていますので、殺虫効力と残効性が増し、散布回数の低減が図れ、より高いレベルの防除効果が得られます。
- 稲の斑点米を発生させる主要カメムシ類に対して幅広く優れた効果を示します。
- カメムシ類以外にも水稻の主要害虫に優れた効果を発揮します。

適用害虫と使用方法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用害虫名	10a当り 使用量	使用時期	総使用回数*	使用方法
稲	カメムシ類 ウンカ類 ツマグロヨコバイ イナゴ類 イネツトムシ ニカメイチュウ フタオビコヤガ	3～4kg	収穫7日前 まで	本剤 3回 クロチアニジン剤 4回 [直播での種時又は 移植時までの処理は 1回、本田での散布、 空中散布、無人航空 機散布は合計3回]	散布
	イネドロオウムシ	3kg			
だ い ず	マメシクイガ ウコンノメイガ	4kg		本剤 3回 クロチアニジン剤 4回 [は種時の土壌混和は 1回、散布は3回]	
	アブラムシ類 カメムシ類 フタスジヒメハムシ	3～4kg			

作物名	適用場所	適用害虫名	10a当り 使用量	使用時期	総使用回数*	使用方法
水田作物、 畑作物 (休耕田)	ヨシ、オギ、ススキ、 セイタカアワダチ ソウ等の多年生雑 草が優占している 休耕田	カメムシ類	3～4kg	—	本剤 4回 クロチアニジン剤 4回	散布

使用にあたって

■使用上の注意

- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しほって散布してください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ①ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。
 - ②関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- マルハナバチに影響を及ぼすおそれがあるので注意してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

■蚕 毒



- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。

■水産動植物への注意

- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

■安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。



- 散布の際は農薬用マスクなどを着用してください。作業後はうがいをしてください。

■貯蔵上の注意

- 密封し、直射日光をさけ、食品と区別してなるべく低温で乾燥した場所に保管してください。

本資料の記載内容は2023年1月17日現在の登録内容に基づいています。