殺虫剤

協友

コテツ[®]フロアブル

クロルフェナピル……………… 10.0%

種類名/クロルフェナビル水和剤 農林水産省登録/第23444号 毒性/劇物 有効年限/5年 包装/250㎡×40、500㎡×20

特 長

- ●適用作物が多く、100以上の幅広い作物に使用できます。
- ●殺虫スペクトラムが広く、チョウ目、アザミウマ目、ダニ目、カメムシ目、コウチュウ目、ハエ目など さまざまな害虫に有効です。

適用害虫と使用法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10a当り 使用液量	使用時期	総使用 回数*	使用方法
りんご	キンモンホソガ ナミハダニ ハマキムシ類 ミノガ類	2000倍				
	ヨモギエダシャク リンゴサビダニ	2000~		収穫前日まで		
 	ミカンキイロアザミウマ	4000倍				散布
	モモハモグリガ カンザワハダニ ナミハダニ	2000倍			20	
ネクタリン	フミハノニ モモサビダニ ウメシロカイガラムシ	200016	200~ 700 l	収穫7日前まで		
4,000	ミカンキイロアザミウマ	2000~ 4000倍				
おうとう	ナミハダニ カンザワハダニ チャノキイロアザミウマ オウトウショウジョウバエ ウメシロカイガラムシ	2000倍				
	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ ミカンキイロアザミウマ ブドウサビダニ ハマキムシ類	2000~ 4000倍				
ぶ どう	ナミハダニ カンザワハダニ ハスモンヨトウ トビイロトラガ モンキクロノメイガ コガネムシ類 ミノガ類 ブドウハモグリダニ	2000倍		収穫60日前まで		

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10a当り 使用液量	使用時期	総使用 回数*	使用方法	
	ナミハダニ カンザワハダニ	2000倍					
かき	カキノヘタムシガ イラガ類 アザミウマ類 カキサビダニ	2000~ 4000倍		収穫14日前まで	2回		
な し	ナミハダニ カンザワハダニ ニセナシサビダニ	2000~ 3000倍			30		
	ヨモギエダシャク チャノキイロアザミウマ	2000倍					
かんきつ	ヨモギエダシャク ハスモンヨトウ リュウキュウミカンサビダニ カネタタキ スグリゾウムシ	2000~ 4000倍 2000~ 6000倍	200∼ 700 €	収穫前日まで	20	散布	
	アザミウマ類 (ネギアザミウマを除く) チャノホコリダニ ミカンサビダニ						
いちじく	ヒラズハナアザミウマ カンザワハダニ ショウジョウバエ類						
小粒核果類	オウトウハダニ ウメシロカイガラムシ イラガ類						
キウイフルーツ	キウイヒメヨコバイ コガネムシ類						
マンゴー	チャノキイロアザミウマ			収穫14日前まで			
ゴレンシ	カンザワハダニ			状は「す口的ので			
ブルーベリー	イラガ類 オウトウショウジョウバエ			収穫前日まで	3回		
あ ず き	ハダニ類 ノメイガ類			収穫3日前まで	20		
豆 類 (未成熟、但し、 えだまめ、実えん どう、さやえんど う、さやいんげん を除く)	ハダニ類	2000倍					
えだまめ	ハダニ類 コフキゾウムシ						
さやいんげん	ハダニ類 アズキノメイガ		100∼ 300 ℓ	収穫前日まで			
実えんどう さやえんどう				N.203.00			
きゅうり	ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ ハダニ類 ウリノメイガ ウリハムシ					3回	
う り 類 (漬物用)	ミナミキイロアザミウマ ハダニ類				20		

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10a当り 使用液量			使用方法
	ミナミキイロアザミウマ	4000倍				
す い か	ハダニ類 オオタバコガ ウリノメイガ				2回	
に が う り か ぼ ち ゃ (日本かぼちゃ)	ミナミキイロアザミウマ					
トマト	オオタバコガ ミカンキイロアザミウマ ナミハダニ トマトサビダニ トマトキバガ		2000倍 4000倍 100~ 300 g		3回	
なす	ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ チャノホコリダニ バダニ類 オオタバコガ ルスモンヨトウ ヨトウムシ テントウムシダマシ類	2000倍		収穫前日まで	4回	
ピーマン とうがらし類 (ししとうを 除く)	ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ オオタバコガ ハダニ類					散布
ししとう	ヒラズハナアザミウマ	4000倍				
キャベツ	コナガ アオムシ タマナギンウワバ ハスモンヨトウ ヨトウムシ シロイチモジヨトウ オオタバコガ ハイマダラノメイガ					
ブロッコリー	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ			収穫3日前まで	2回	
茎ブロッコリー	アオムシ			収穫前日まで		
カリフラワー	コナガ	0000 #*		収穫3日前まで	1	
ザーサイ		2000倍		収穫14日前まで		
メキャベツ 非結球メキャベツ	ハスモンヨトウ			収穫7日前まで		
なばな類				収穫3日前まで	-	
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ カブラハバチ			収穫前日まで		
非結球あぶらな 科葉菜 類(こま つな、チンゲン サイ、なばな類、 非結球はくさい、 非結球メキャベ ツを除く)	コナガ			収穫14日前まで	10	

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10a当り 使用液量	使用時期	総使用 回数*	使用方法
チンゲンサイ	コナガ			収穫7日前まで	10	
非結球はくさい	アオムシ コナガ				2回	
こまつな	アオムシ コナガ ハクサイダニ			収穫3日前まで	10	散布
だいこん	アオムシ コナガ ダイコンサルハムシ			収穫14日前まで		
זט מ	コナガ ナモグリバエ ヨトウムシ					
みょうが (花穂)	ハダニ類			収穫前日まで		散布 但し花穂の発 生期にはなる チフィルム被覆 により散布穂で が直接ない状態で使用する
みょうが (茎葉)			100~	みょうが (花穂) の 収穫前日まで 但し、花穂を収穫 しない場合にあって は開花期終了まで	2回	
いちご	ハダニ類 ハスモンヨトウ シクラメンホコリダニ ミカンキイロアザミウマ		300 €	収穫前日まで		
ね ぎ	シロイチモジヨトウ ヒョウタンゾウムシ類 ネギハモグリバエ ネギコガ			収穫7日前まで		
オ ク ラ	ハスモンヨトウ オオタバコガ					
レタス	ハスモンヨトウ オオタバコガ ナモグリバエ ヨトウムシ		収穫前日まで			散布
モロヘイヤ	アザミウマ類				10	
あしたば	ウドノメイガ			収穫7日前まで		
やまのいも	カンザワハダニ			収穫前日まで		
やまのいも (むかご)	カンサワハタニ ナガイモコガ 			収穫3日前まで	2回	
	ハスモンヨトウ ハダニ類					
かんしょ	ヨツモンカメノコハムシ シロイチモジヨトウ	2000~ 4000倍		収穫前日まで		
	ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ	16倍	1.6 &			無人航空機散布

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10a当り 使用液量	使用時期	総使用 回数*	使用方法
は す い も (葉柄)				収穫前日まで		
さといも	カンザワハダニ ハスモンヨトウ		100∼ 300ℓ	収穫7日前まで		
さといも (葉柄)				収穫3日前まで		
アスパラガス	バダニ類 オオタバコガ バスモンヨトウ ジュウシホシクビナガバムシ ヨトウムシ		100∼ 500ℓ	収穫前日まで		
ふき	ハスモンヨトウ			収穫7日前まで	2回	
ふ き (ふきのとう)	ハダニ類			収穫90日前まで		
てんさい	ヨトウムシ ハダニ類 カメノコハムシ	2000倍		収穫7日前まで		散布
セルリー	ヨトウムシ	200010		収穫14日前まで		HX111
にんじん	ヨトウムシ キアゲハ ヒョウタンゾウムシ類		100∼ 300 €	収穫前日まで	1回	
みつば				収穫14日前まで但し、 伏せ込み栽培は 伏せ込み前まで		
みしまさいこ				収穫21日前まで	20	
エンサイ				収穫3日前まで		
コリアンダー(葉) やなぎたで	ハスモンヨトウ			収穫7日前まで		
つるむらさき					10	
しゅんぎく				収穫14日前まで		
しょうが		32倍	3.2 &	収穫前日まで	2回	無人航空機散布
葉ごぼう				収穫7日前まで	3回	
すいぜんじな	ハダニ類 ヨトウムシ			収穫前日まで	2回	
よ も ぎ	ミナミキイロアザミウマ			収穫3日前まで	10	
葉にんにく		2000倍	100			
つわぶきと う き			100∼ 300 ℓ	収穫14日前まで	2回	散布
せんきゅう	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			収穫前日まで		
たらのき				収穫90日前まで		
はまぼうふう (葉)				親株養成期 但し、 収穫90日前まで	3回	

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10a当り 使用液量	使用時期	総使用 回数*	使用方法
う ど	シクラメンホコリダニ	2000倍	100~	根株養成期 但し、 収穫75日前まで	2回	
ほうれんそう	ホウレンソウケナガコナダニ	4000~ 6000倍	300 €	2葉期まで 但し、 収穫14日前まで	10	
さんしょう (果実)	チャノキイロアザミウマ	4000倍	200∼ 700 ℓ	収穫7日前まで		
とうもろこし 飼料用とうも ろこし (子実) ヤングコーン	ハダニ類 オオタバコガ ツマジロクサヨトウ			収穫前日まで		
食用プリムラ	バスモンヨトウ ヨトウムシ類 バダニ類 ミカンキイロアザミウマ					
食用金魚草 食用なでしこ 食用エキザカム 食用せんにちこう 食用トレニア 食用パンジー	ミカンキイロアザミウマ ヨトウムシ類 ハダニ類		100∼ 300 €	収穫14日前まで		
食用ミニバラ				収穫3日前まで		散布
なんてん (葉)	アザミウマ類	2000倍		収穫14日前まで		
茶	チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ カンザワハダニ チャノナガサビダニ チャノホコリダニ シャクトリムシ類 チャノコカクモンハマキ マダラカサハラハムシ チャトゲコナジラミ		200∼ 400 ℓ	摘採 7日前まで	2回	
食用ぎく	 ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ		100~	収穫3日前まで		
きく(葉)	ヨトウムシ類 ハダニ類		300 €	収穫7日前まで		
* <	オオタバコガ アワダチソウグンバイ 					
ストック	コナガ アオムシ ヨトウムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ ヨトウムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ	ワマ	150∼ 300 ℓ			
花 き 類 ・ 観 葉 植 物 (きく、ストック を除く)				発生初期		
1 ± 7.			200∼ 700 ℓ			
し き み 	クスアナアキゾウムシ 	60倍	6~21 e			無人航空機 散布
アザレア	チャノホコリダニ	2000倍	100∼ 300 ℓ			散布

作物名	,	適用場所	第四字中名	10a当り使用量		使用時期	総使用回数*	体田士 法
TF物在	•	週 用场所	適用害虫名	使用量	使用液量	使用时期	松使用凹致	使用方法
みか	Ь	温室、 ガラ ス室等密閉	ミカンキイロアザミウマ	300me	100	収穫前日まで	20	常温煙霧
ぶ ど	う		チャノキイロアザミウマ	150m2	6 e	収穫14日前まで		市/皿/圧務

上手な使い方

- ●コナガ、ハダニ類、アザミウマ類は抵抗性が発達しやすいので、作用性の異なる他の薬剤と輪番で、 1作期1回の使用としてください。
- ●はくさい、だいこんの幼苗期は薬害のおそれがあるので、定植活着後、8葉期以降に使用してください。
- ●なす、きゅうりの幼苗期(1~3葉期)には薬害を生じる場合があるので、使用しないでください。
- ●マメコバチに影響があるので、受粉にマメコバチを利用する場合は開花期での使用はさけてください。

使用にあたって

■使用上の注意

- ●使用の際は容器をよく振って均一な状態にしてから所定量を取り出してください。
- ●ハウス等の常温煙霧に使用する場合は、次のことに注意してください。
 - ①専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧してください。特に常温煙霧装置の選定および使用に 当っては病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
 - ②できるだけ日中の煙霧はさけ、夕刻から煙霧し、6時間以上密閉状態にしてください。
- ●散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせ調節してください。
- ●ミツバチに対して影響があるので以下のことを注意してください。
- ●ミツバチに対して影響があるのでは、いっことではあって、いっこの ①ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。無人航空機による散布で それらに飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
 - ②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
 - ③関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを 確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止 に努めてください。
- ●マルハナバチに対して影響があるので注意してください。
- ●植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないように葉の表裏に十分に散布してください。
- ●ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布むらのないように ていねいに散布してください。
- ●みずかけな(水掛菜)に使用する場合は、圃場内に水がない状態で使用してください。また、使用後 14日間は入水しないでください。
- ●カラーおよび花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しないでください。また、使用後14日間は 入水しないでください。
- ●無人航空機散布に関する注意については「製品情報と注意事項」の見方、「空中散布、無人航空機 (無人 ヘリコプター等) 散布・滴下に関する注意」をご参照ください。
- ●本剤を無人航空機で散布する場合は、散布薬液の飛散による他の分野への影響に注意して、散布地域 の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- ●本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用 する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- ●適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合には、使用者の責任におい て事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を 受けることが望ましいです。

■混用・薬害

- ●ボルドー液と混用する場合は凝集することがあるので、本剤を調製した後にボルドー液と混合して ください。
- ●きゅうり、なす、はくさい、だいこん、非結球あぶらな科葉菜類、なばなおよびセルリーの幼苗期に 使用すると薬害を生じることがあるので注意してください。

- ●ピーマン、とうがらし類に使用する場合、品種により葉に褐点などの薬害を生じることがあるので 予備散布により薬害の出ないことを確認してから散布してください。
- ●かき(刀根早生など)の着色期の散布は薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
- すいかに使用する場合、葉に薬害を生じることがありますが、その後の生育に対する影響は認められていません。
- ●にがうりの幼苗期には薬害を生じるので、定植前には使用しないでください。定植後のにがうりに使用する場合、葉に灰褐色などの斑点の薬害を生じることがあるので予備散布により薬害の出ないことを確認してから散布してください。
- ●西洋かぼちゃ(黒皮栗、青皮栗、えびす、雪化粧、みやこ、黒皮甘栗、栗味、栗マロン、芳香等)には薬害を生じるおそれがあるので使用しないでください。
- ●ほうれんそうに使用する場合、葉に白化などの薬害を生じるおそれがあるので、必ず使用時期を守って 使用してください。
- ●ばら、食用ミニバラに本剤を初めて使用する場合は、事前に薬害の有無を十分確認してから使用して ください。
- ●カーネーションへの散布は薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
- ●シクラメンに使用する場合、新葉に薬害を生じる場合があるので、薬害の出ないことを事前確認して から散布してください。
- ●周辺の作物にかかると薬害を生じる場合があるので、かからないよう十分注意して散布してください。

■ 春 畫

● 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にかからないようにしてください。

■水産動植物への注意

- ●水産動植物(魚類、甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう 注意して使用してください。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- ●使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

■安全使用上の注意

- ●医薬用外劇物ですので取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、 直ちに医師の手当てを受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の 手当てを受けてください。
- む
 か
 前
 布等の作業の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- ●常温煙霧中はハウス内へ入らないでください。また、常温煙霧終了後はハウスを開放し、十分換気した後に入室してください。
- ●街路、公園等で使用する場合は、散布中および散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

■貯蔵上の注意

●密栓し、直射日光をさけ、鍵のかかるなるべく低温な場所に保管してください。

本資料の記載内容は2025年8月18日現在の登録内容に基づいています。