

アマシユラ

水稲用一発処理除草剤



NEW

1キロ粒剤 フロアブル ジャンボ 400FG

®は協友アグリ(株)の登録商標です。

急ぐことなし! まだ間に合う!
4葉期までの大きなノビエも枯らす!

ノビエ
4葉期まで

ホタルイ
4葉期まで
※ジャンボ・400FGは5葉期まで

クログワイ
草丈 20cmまで

オモダカ
矢じり葉 3葉期まで

コウキヤガラ
草丈 30cmまで

イボクサ
草丈 10cmまで



**1キロ粒剤
フロアブル
ジャンボ
400FG**

特長

ノビエの4葉期、葉齢の進んだオモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、イボクサにも優れた効果

- ノビエの4葉期まで枯らし、後発のノビエの発生も長く抑制します。
- 葉齢が進んだ多年生雑草(オモダカ矢じり葉3葉、クログワイ草丈20cm、コウキヤガラ草丈30cmまで)に高い効果を示します。
- SU抵抗性雑草(ホタルイ、コナギ、オモダカ等)に優れた効果を発揮します。
- 田植同時処理や移植直後の処理に加えて、遅めの散布にも適しています。

適用雑草の範囲及び使用方法

Asheara 1キロ粒剤

■有効成分(一般名) ビラクロニル:2.0% トリアファモン:0.5% ベンゾピシクロン:2.0% ■人畜毒性:普通物* *毒物及び劇物に該当しないものを指している総称 ■農林水産登録 第24322号

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	総使用回数	使用方法	雑草名	散布適期
移植水稻	一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミスガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、キシュウスズメノヒエ、アオミドロ・藻類による表層はく離	移植時	1kg/10a	本剤 ビラクロニル剤 1回 トリアファモン剤 2回 ベンゾピシクロン剤 3回	田植同時散布機で 施用	ノビエ	4葉期まで
		移植直後～ ノビエ4葉期 但し、 移植後30日まで				ホタルイ・ヘラオモダカ	4葉期まで
直播水稻	一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	稲1葉期～ ノビエ4葉期 但し、 収穫90日前まで	1kg/10a	本剤 ビラクロニル剤 1回 トリアファモン剤 2回 ベンゾピシクロン剤 3回	温水散布 又は 無人航空機による 散布	ウリカワ	5葉期まで
						ミスガヤツリ	草丈20cmまで
						ヒルムシロ	発生期まで
						セリ	再生期まで
						オモダカ	矢じり葉3葉期まで
						クログワイ	草丈20cmまで
						コウキヤガラ	草丈30cmまで
						キシュウスズメノヒエ	再生葉3葉期まで
						アオミドロ・藻類による表層はく離	発生前から発生始期まで

Ashearaフロアブル

■有効成分(一般名) ビラクロニル:3.8% トリアファモン:0.96% ベンゾピシクロン:3.8% ■人畜毒性:普通物* *毒物及び劇物に該当しないものを指している総称 ■農林水産登録 第24147号

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	総使用回数	使用方法	雑草名	散布適期
移植水稻	一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミスガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、多年生イネ科雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離	移植時	500mℓ /10a	本剤 ビラクロニル剤 1回 トリアファモン剤 2回 ベンゾピシクロン剤 3回	田植同時散布機で 施用	ノビエ	4葉期まで
		移植直後～ ノビエ4葉期 但し、 移植後30日まで				ホタルイ・ヘラオモダカ・ウリカワ	4葉期まで
直播水稻	一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	稲1葉期～ ノビエ4葉期 但し、 収穫90日前まで	500mℓ /10a	本剤 ビラクロニル剤 1回 トリアファモン剤 2回 ベンゾピシクロン剤 3回	原液温水散布、 水口施用 又は 無人航空機による 滴下	ミスガヤツリ	草丈25cmまで
						ヒルムシロ	発生期まで
						セリ	再生期まで
						オモダカ	矢じり葉3葉期まで
						クログワイ	草丈20cmまで
						コウキヤガラ	草丈30cmまで
						エゾノサヤナカグサ	2葉期まで
						キシュウスズメノヒエ	再生葉3葉期まで
						アオミドロ・藻類による表層はく離	発生前まで

Ashearaジャンボ

■有効成分(一般名) ビラクロニル:5.0% トリアファモン:1.25% ベンゾピシクロン:5.0% ■人畜毒性:普通物* *毒物及び劇物に該当しないものを指している総称 ■農林水産登録 第24320号

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	総使用回数	使用方法	雑草名	散布適期
移植水稻	一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミスガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、キシュウスズメノヒエ、アオミドロ・藻類による表層はく離	移植直後～ ノビエ4葉期 但し、 移植後30日まで	小包装 (パック) 10個 (400g) /10a	本剤 ビラクロニル剤 1回 トリアファモン剤 2回 ベンゾピシクロン剤 3回	水田に 小包装(パック) のまま 投げ入れる	ノビエ	4葉期まで
		移植時				ホタルイ・ウリカワ	5葉期まで
直播水稻	一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	稲1葉期～ ノビエ4葉期 但し、 収穫90日前まで	小包装 (パック) 10個 (400g) /10a	本剤 ビラクロニル剤 1回 トリアファモン剤 2回 ベンゾピシクロン剤 3回	水田に 小包装(パック) のまま 投げ入れる	ヘラオモダカ	4葉期まで
						ミスガヤツリ	草丈20cmまで
						ヒルムシロ	発生期まで
						セリ	再生期まで
						オモダカ	矢じり葉3葉期まで
						クログワイ	草丈20cmまで
						コウキヤガラ	草丈30cmまで
						キシュウスズメノヒエ	再生葉3葉期まで
						アオミドロ・藻類による表層はく離	発生前まで

Asheara400FG

■有効成分(一般名) ビラクロニル:5.0% トリアファモン:1.25% ベンゾピシクロン:5.0% ■人畜毒性:普通物* *毒物及び劇物に該当しないものを指している総称 ■農林水産登録 第24321号

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	総使用回数	使用方法	雑草名	散布適期
移植水稻	一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミスガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、キシュウスズメノヒエ、アオミドロ・藻類による表層はく離	移植直後～ ノビエ4葉期 但し、 移植後30日まで	400g /10a	本剤 ビラクロニル剤 1回 トリアファモン剤 2回 ベンゾピシクロン剤 3回	温水散布、 温水周縁散布 又は 無人航空機 による散布	ノビエ	4葉期まで
		移植時				ホタルイ・ウリカワ	5葉期まで
直播水稻	一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	稲1葉期～ ノビエ4葉期 但し、 収穫90日前まで	400g /10a	本剤 ビラクロニル剤 1回 トリアファモン剤 2回 ベンゾピシクロン剤 3回	温水散布、 温水周縁散布 又は 無人航空機 による散布	ヘラオモダカ	4葉期まで
						ミスガヤツリ	草丈20cmまで
						ヒルムシロ	発生期まで
						セリ	再生期まで
						オモダカ	矢じり葉3葉期まで
						クログワイ	草丈20cmまで
						コウキヤガラ	草丈30cmまで
						キシュウスズメノヒエ	再生葉3葉期まで
						アオミドロ・藻類による表層はく離	発生前まで

△ 使用上の注意事項 (抜粋)

- 4割剤に共通する注意事項
 - 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの4葉期までに1回時期を失ないように使用してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果に差が出るので、必ず適期に使用するようご注意ください。
 - 著しい降雨が予想される場合には除草効果が低下するおそれがあるため散布を控えてください。
 - 軟弱な苗を移植した水田、極端な浅槽をした水田、極端な深水となった水田及び砂埃土で漏水の大きな水田(減水深2cm/日)以上では、薬害を生じるおそれがあるため使用しないでください。
 - 本剤を使用した水田の田面水は、他作物の灌水に用いないでください。
 - 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないよう注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用してください。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
 - 水産動物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
 - 散布後は水管理に注意してください。
 - 蜜に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないよう注意してください。
 - 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋・空容器等は水産動物に影響を与えないよう適切に処理してください。
 - 密封・密栓し、直射日光を避け、食品と区別して、子供の手のとどかないなるべく低温で乾燥した場所に保管してください。
- 1キロ粒剤・フロアブル・FGに共通する注意事項
 - 使用量に合わせ秤量し、使い切ってください。
 - 1キロ粒剤・ジャンボ・FGに共通する注意事項
 - 浅槽・密栓し、浮き苗が生じないように、代かき、均平作業及び補え付けは行わないで行ってください。未熟有機物を施用した場合は、特に注意して行ってください。
 - 水口施用の場合は、入水時に本剤を水口に施用し、流入水とともに水田全面に拡散させ、処理後田面水が通常の湛水状態(湛水深3～5cm)に達したときに必ず水を止め、田面水があふれ出ないように注意してください。
 - 無人航空機による滴下で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
 - 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落してください。
 - 本剤は小包装(パック)のまま、10アール当たり10個の割合で水田に均等に投げ入れてください。
 - パックに使用しているフィルムは水溶性なので、濡れた手で作業したり、降雨で破袋することがないようにしてください。
 - 藻や浮き草が多発している水田では、拡散が不十分となり部分的な薬害や効果不足を生じることがあるので湛水周縁散布を避け、水田全面に拡散してください。
 - 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、散布の際は手袋、長スリーブ・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落してください。
- FGの注意事項
 - 藻や浮き草が多発している水田では、拡散が不十分となり部分的な薬害や効果不足を生じることがあるので湛水周縁散布を避け、水田全面に拡散してください。
 - 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、散布の際は手袋、長スリーブ・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は圃場などに放置せず、適切に処理してください。