

殺虫殺菌剤

ノンプラスパリダ[®]ダントツ[®]フロアブル

クロチアニジン	6.6%
トリシクラゾール	8.0%
パリダマイシンA	5.0%
フェリムゾン	15.0%

種類名／クロチアニジン・トリシクラゾール・
パリダマイシン・フェリムゾン水和剤
農林水産省登録／22891号
毒性／普通物*
有効年限／2年(500mℓ、1ℓ)、1年(10ℓ、20ℓ)
包装／500mℓ×20、1ℓ×12、10ℓ、20ℓ

特 長

- いもち病、紋枯病、ウンカ類、カメムシ類を同時防除できる殺虫殺菌剤です。
- ノンプラスはいもち病に、パリダシンは紋枯病にそれぞれ優れた効果を示します。
- ダントツは斑点米の原因となるカメムシ類、ウンカ類に高い効果を発揮します。
- 無人ヘリコプターでの散布ができ、大規模圃場での省力防除が可能です。
- 稲の仕上げ剤として適しており、高品質米の生産に役立ちます。

適用病害虫と使用方法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10a当り使用量	使用時期	総使用回数*	使用方法
稲	いもち病 紋枯病 ウンカ類 カメムシ類	8倍	800mℓ	収穫14日前 まで	本剤 2回 クロチアニジン剤 4回	無人ヘリ 散布
		300倍	25ℓ		〔直播では種時又は移 植時までの処理は1回、 本田での散布、空中散布、 無人ヘリ散布は合計3回〕	
	いもち病 紋枯病 ウンカ類 カメムシ類 穂枯れ (こま葉枯病菌) イナゴ類	1000倍	60～150ℓ		トリシクラゾール剤 4回 〔育苗箱への処理は1回、 本田では3回〕 パリダマイシン剤 6回 〔育苗箱灌注は1回、本田 では5回〕 フェリムゾン剤 2回	



使用者への被害防止方法（調製・散布）

稲：農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣



使用にあたって

■使用上の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤は長期間貯蔵しておくとは分離するので、使用の際は容器をよく振って均一な状態に戻してから所定量を取り出してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 無人ヘリコプター散布に関する注意については「製品情報と注意事項」の見方、「空中散布、無人航空機（無人ヘリコプター等）散布・滴下に関する注意」をご参照ください。
- 散布薬液の飛散によって動植物、特に野菜類の幼苗、なし（二十世紀、幸水、新水等）等の農作物の被害や自動車の塗装等に被害を与えるおそれがあるなど、各分野に影響があるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 本剤を希釈倍数300倍で使用する場合は、少量散布に適したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用してください。



●ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。

- ①ミツバチの巣箱およびその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
- ②関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。

- マルハナバチに影響を及ぼすおそれがあるので注意してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

■薬 害

- 野菜類の幼苗およびなし（二十世紀、幸水、新水等）には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- たばこ、けいとうおよび幼植物のだいず、あずき、いんげんまめには薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- きく（秀芳の力等）には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。

■蚕 毒



- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。

■生活環境動植物への注意

- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

■安全使用上の注意

- 飲み込むと有害です。
- 吸入すると有害です。
- ミストの吸入をさけてください。
- 屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。
- 使用の際、飲食または喫煙をしないでください。
- 作業後は手足、顔などをよく洗い、うがいをしてください。
- 誤って飲み込んだ場合、気分が悪いときは医師の手当てを受けさせてください。
- 吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。気分が悪いときは医師の手当てを受けてください。

■貯蔵上の注意

- 密栓し、直射日光をさけ、なるべく低温な場所に保管してください。

本資料の記載内容は2026年7月22日現在の登録内容に基づいています。