

殺菌剤

協友

アンビル[®]フロアブル

ヘキサコナゾール……………2.0%

種類名/ヘキサコナゾール水和剤
 農林水産省登録/第21784号
 毒性/普通物*
 有効年限/5年
 包装/500ml×20

特 長

- 本剤はトリアゾール系の殺菌剤で、EBI剤に属します。
- フロアブル製剤で水に溶けやすく、散布液の調製が容易です。
- 低濃度で高い予防効果と治療効果を発揮します。
- 浸透移行性に優れ、速やかに作物体内にいきわたり、的確な効果を発揮します。
- ボルドー液とも混用できます。

適用病害と使用法


使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用病害名	希釈倍数	10a当り 使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法
りんご	斑点落葉病 褐斑病 モニリア病	1000倍	200～700ℓ	収穫7日前まで	3回	散布
	なし	赤星病 黒星病 うどんこ病				
もも		灰星病 黒星病		1000倍		
	ネクタリン			うどんこ病		
かき		うどんこ病				
	おうとう			灰星病		
すもも		灰星病	収穫7日前まで			
	あんず		さび病	1000倍	収穫前日まで	
いちじく		白さび病 うどんこ病			150～300ℓ	
	きく		うどんこ病			
花き類・ 観葉植物 (ばら、きくを 除く)		うどんこ病				
	ばら		葉さび病 炭そ病			
やなぎ		赤星病 炭そ病				
	ぼけ		さび病			
せいよう きんしばい		炭そ病				
	樹木類 (やなぎ、ぼけ、 せいようきん しばいを除く)		炭そ病			

作用特性

■使用上の注意

- 予防と治療、同時に2つの効果。



使用にあたって

■使用上の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 使用前に容器をよく振ってから本剤の所要量を所定量の水にうすめ、よくかき混ぜてから散布してください。
- りんごの斑点落葉病に対して使用する場合は、落花後20日頃までの初期防除剤として使用してください。
- りんごのモニリア病に対して使用する場合は、予防的な散布は効果が劣るおそれがあるので、葉腐れの初期病斑発見直後に使用してください。
- ばらに使用する場合、収穫期の散布では、汚れを生じるおそれがあるので留意してください。
- カラーおよび花はすに使用する場合は、湿水状態で使用しないでください。また、使用后14日間は入水しないでください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合には、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

■薬害

- りんごの旭種に対してはサビ果を生じるおそれがあるので、使用をさけてください。

■安全使用上の注意

- 誤飲などのないように注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けてください。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また、散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中および散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意してください。

■貯蔵上の注意

- 密栓し、直射日光をさけ、なるべく低温な場所に保管してください。

本資料の記載内容は2023年1月17日現在の登録内容に基づいています。