

## 水稻除草剤

# アシュラ<sup>®</sup> ジャンボ

トリアファモン	1.25%
ピラクロニル	5.0%
ベンゾピシクロン	5.0%

種類名/トリアファモン・ピラクロニル・  
ベンゾピシクロン粒剤  
農林水産省登録/第24320号  
毒性/普通物\*  
有効年限/5年  
包装/(40g×10)×10、4kg×1

### 特 長

- 高葉齢のノビエ(4葉期)まで枯らし、後発のノビエの発生も長く抑制します。
- 葉齢の進んだ多年生難防除雑草(オモダカ矢じり葉3葉期、クログワイ草丈20cmおよびコウキヤガラ草丈30cm等)に対して高い効果を示します。
- SU抵抗性雑草(ホタルイ、コナギ、オモダカ等)に対して高い効果を示します。
- イボクサなど畦畔から侵入する雑草に対して高い効果を示します。
- 水稻に対する安全性が高く、使用時期が幅広いことから、移植水稲では移植直後の処理に加えて遅めの散布にも対応でき、湛水直播水稲では初期剤を省略した一発処理も可能です。

### 適用雑草と使用法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用雑草名	使用時期	10a当り 使用量	総使用回数*	使用方法
移植水稲	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミスガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ コウキヤガラ 多年生イネ科雑草 アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植直後～ ノビエ4葉期 但し、 移植後30日まで	小包装 (パック) 10個 (400g)	本剤 1回 トリアファモン剤 2回 ピラクロニル剤 2回 ベンゾピシクロン剤 3回	水田に 小包装 (パック)の まま投げ 入れる
直播水稲	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミスガヤツリ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ	稲1葉期～ ノビエ4葉期 但し、 収穫90日前まで			

### 使用にあたって

#### ■使用上の注意

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの4葉期までに時期を失ないように使用してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に使用するようご注意ください。ミスガヤツリは草丈30cmまで、ホタルイは花茎10cmまで、ウリカワは5葉期まで、ヘラオモダカは4葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生期まで、オモダカは矢じり葉3葉期まで、クログワイは草丈20cmまで、コウキヤガラは草丈30cmまで、エゾノサヤヌカグサは2葉期まで、キシウズズメノヒエは再生茎3葉期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前までが本剤の散布適期です。また、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生期間が長く遅い発生のもので十分効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。

- 散布に当っては、水の出入りを止め5～6cmの湛水状態を保ってください。本剤散布後、少なくとも3～4日間は通常の湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 本剤は小包装(パック)のまま、10アール当り10個の割合で水田に投げ入れてください。
- パックに使用しているフィルムは水溶性なので、ぬれた手で作業したり、降雨で破袋することがないようにしてください。
- 藻や浮き草が多発している水田では、拡散が不十分となり部分的な葉害や効果不足を生じることがあるので使用をさけてください。
- 浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平作業および植え付けはていねいに行ってください。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいに行ってください。
- 著しい降雨が予想される場合には除草効果が低下するおそれがあるので、散布を控えてください。
- 空袋等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用してください。特に初めて使用する場合は異常気象の場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

#### ■薬害

- 軟弱な苗を移植した水田、極端な浅植えをした水田、極端な深水となった水田および砂質土で漏水の大きな水田(減水深2cm/日以上)では、葉害を生じるおそれがあるので使用しないでください。
- 本剤はその殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意してください。
- いぐさ栽培予定の水田では使用しないでください。
- 葉害を生じるおそれがあるので、後作物としてなす、たまねぎおよびさやえんどうを栽培しないでください。
- 本剤散布後の田面水を他作物に灌水しないでください。

#### ■蚕毒

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。

#### ■水産動植物への注意

- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

#### ■安全使用上の注意

- 本剤は水溶性フィルムで小包装化されているため、ぬれた手で触らないでください。
- 水溶性フィルム包装が破袋した場合は以下の点に注意してください。
  - ①眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
  - ②皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。

#### ■貯蔵上の注意

- 水溶性フィルムは吸湿性があるので、湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を固く閉じて保管してください。また、強く加圧されると水溶性フィルムが劣化するおそれがあるので下積みにならないようにしてください。
- 密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、子供の手のとどかないなるべく低温で乾燥した場所に保管してください。