

殺虫剤

協友

ダントツ[®]粉剤DL

クロチアニジン…………… 0.15%

種類名／クロチアニジン粉剤
農林水産省登録／第21595号
毒性／普通物*
有効年限／5年
包装／3kg×8

特 長

- 稲のカメムシ類に対して殺虫効果および吸汁抑制効果を示し、斑点米の発生を抑制します。
- 幅広い殺虫スペクトラムを有し、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、イナゴ類、イネドロオイムシ、カメムシ類に対して優れた防除効果を発揮します。
- 有機リン系、カーバメート系、合成ピレスロイド系薬剤に対する感受性が低下した害虫にも高い効果を示します。
- 速効的に作用し、長期間効果が持続します。
- ウンカ・ヨコバイ等の重要天敵であるクモ類に対する影響の少ない薬剤です。

適用害虫と使用法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用害虫名	10a当り 使用量	使用時期	総使用回数*	使用方法
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	3～4kg	収穫7日前 まで	本剤 3回 クロチアニジン剤 4回 [直播では種時又は 移植時までの処理は 1回、本田での散布、 空中散布、無人ヘリ 散布は合計3回]	散布
	イナゴ類	4kg			
	イネドロオイムシ フタオビコヤガ	3kg			
だ い ず	アブラムシ類 カメムシ類 フタスジヒメハムシ	4kg		本剤 3回 クロチアニジン剤 4回 [は種時の土壌混和は 1回、散布は3回]	

作物名	適用場所	適用害虫名	10a当り 使用量	使用時期	総使用回数*	使用方法
水田作物、 畑作物 (休耕田)	ヨシ、オギ、スキ、 セイタカアワダチ ソウ等の多年生雑 草が優占している 休耕田	カメムシ類	3～4kg	—	本剤 4回 クロチアニジン剤 4回	散布

使用にあたって

■使用上の注意

- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しほって散布してください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ① ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。
 - ② 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- マルハナバチに影響を及ぼすおそれがあるので注意してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病虫害防除等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

■ 蚕 毒

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。

■ 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。



- 散布の際は農業用マスクなどを着用してください。作業後はうがいをしてください。

■ 貯蔵上の注意

- 密封し、直射日光をさけ、食品と区別してなるべく低温で乾燥した場所に保管してください。

本資料の記載内容は2023年1月17日現在の登録内容に基づいています。