

殺菌剤

リンバー[®]粒剤

フラメトビル…………… 1.5%

種類名/フラメトビル粒剤
農林水産省登録/第19366号(住友化学登録)
毒性/普通物*
有効年限/5年
包装/3kg×8

特 長

- イネ紋枯病および疑似紋枯症に強力な抗菌活性を示します。
- 菌糸伸長・病原力阻害などの優れた作用特性を有しています。
- 速効性や予防・治療(病斑進展阻止)効果を有しています。
- 残効性に優れ、イネ体への吸収移行も速やかに行われるので、粒剤の水面施用でも高い効果を発揮します。
- 出穂期からその1ヶ月前程度の広い適期幅を有しています。

適用病害と使用法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用病害名	10a当り 使用量	使用時期	総使用回数*	使用方法
稲	紋枯病 疑似紋枯症 (褐色菌核病菌) (赤色菌核病菌)	3~4kg	収穫30日前まで	本剤 2回 フラメトビル 2回 [直播でのほ種時又は移植時 までの処理は1回]	散布

使用にあたって

■使用上の注意

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 散布に当っては湛水状態(水深3cm以上)で播きむらのないように均一に散布し、散布後少なくとも3~4日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 漏水の激しい水田では効果が劣る場合があるので使用をさけてください。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

■水産動植物への注意

- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 散布後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。

■安全使用上の注意

- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

■貯蔵上の注意

- 密封し、直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。

本資料の記載内容は2024年7月25日現在の登録内容に基づいています。