だいずのハスモンヨトウ、
かんしょのナカジロシタバには
無人航空機での
高濃度少量散布も可能です！

適用作物充実!!

野菜・豆・花きの害虫防除に



適用拡大!!

害虫追加

キャベツ／ネギアザミウマ
ブロッコリー／シロイチモジヨトウ

※詳細は裏面でご確認ください。

天敵にヤサシク。害虫にキビシイ！

プレオ®フロアブル

PLEO

プレオは住友化学(株)の登録商標

農林水産省登録 第21333号

PLEO

野菜・豆・花きの害虫防除に プレオ® フロアブル

有効成分：ピリダリル……10.0％

特長

1. ユニークな作用性 ── 従来の殺虫剤とは異なる作用性で、ローテーション散布の基幹剤として有用です。
2. 優れた殺虫活性と残効性 ── 高い殺虫活性と優れた残効性により、作物を害虫から守ります。
3. 天敵・有用昆虫に対する影響が少ない ── 天敵昆虫などを利用したIPM(総合的病害虫管理)の基幹剤として適しています。

【適用作物・害虫と使用方法】

2022年1月現在の登録内容(太字は2021年12月22日適用拡大)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10a当り使用液量	使用時期	本剤の使用回数及びピリダリルを含む農薬の総使用回数	使用方法
キャベツ	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ オオタバコガ、ハイマダラノメイガ ウワバ類、シロイチモジヨトウ、**ネギアザミウマ**	1000倍	100～300ℓ	収穫7日前まで	2回以内	散布
はくさい	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、オオタバコガ					
非結球あぶらな科葉菜類 (こまつな、みずな、なばな類を除く)	コナガ、ハスモンヨトウ					
こまつな、みずな				収穫前日まで		
すいぜんじな	ハスモンヨトウ	2000倍				
なばな類	コナガ、ハスモンヨトウ	1000倍		収穫14日前まで		
しゅんぎく	ハスモンヨトウ			収穫前日まで		
レタス	アザミウマ類			収穫7日前まで		
立ちちしゃ、リーフレタス	ナモグリバエ、ハスモンヨトウ オオタバコガ					
カリフラワー	コナガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ			収穫3日前まで		
茎ブロッコリー	ハスモンヨトウ					
ブロッコリー	コナガ、ハスモンヨトウ、**シロイチモジヨトウ**			収穫7日前まで		
セルリー	ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類			収穫前日まで		
なす	ハスモンヨトウ、オオタバコガ アザミウマ類、ハモグリバエ類				4回以内	
トマト ミニトマト	ハスモンヨトウ、オオタバコガ ハモグリバエ類、シロイチモジヨトウ				2回以内	
ピーマン	アザミウマ類、タバコガ類					
とうがらし類						
ねぎ	シロイチモジヨトウ、ネギアザミウマ				4回以内	
たまねぎ	シロイチモジヨトウ、ネギアザミウマ ハスモンヨトウ			収穫3日前まで	2回以内	
にら	ネギアザミウマ			収穫前日まで		
だいこん	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、カブラハバチ			収穫14日前まで		
かぶ	ハスモンヨトウ			収穫3日前まで		
にんじん				収穫前日まで		
ごぼう				収穫7日前まで		
アスパラガス	ハスモンヨトウ、オオタバコガ ヨトウムシ、ネギアザミウマ		**100～500ℓ**	収穫前日まで		
きゅうり、メロン	ハモグリバエ類、アザミウマ類、ウリノメイガ		100～300ℓ			
すいか	ハスモンヨトウ、オオタバコガ アザミウマ類、ウリノメイガ					
にがうり	ハスモンヨトウ					
とうがん	ミナミキイロアザミウマ					
いちご	ハスモンヨトウ、オオタバコガ				4回以内	
だいず	ハスモンヨトウ	8～16倍	800mℓ	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布
	オオタバコガ、ハモグリバエ類	1000倍	100～300ℓ			散布
	ハスモンヨトウ、マメシンクイガ、シロイチモジヨトウ	1000～2000倍				
さやいんげん	ハモグリバエ類、オオタバコガ、ヨトウムシ	1000倍		収穫前日まで		
豆類 (未成熟、**ただし、さやいんげんを除く**)	ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ	1000～2000倍				
豆類 (種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)	オオタバコガ、ハモグリバエ類	1000倍		収穫7日前まで		
	ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ	1000～2000倍				
しょうが	ハスモンヨトウ	1000倍		収穫前日まで		
みょうが(花穂)						
みょうが(茎葉)						
ほうれんそう						
	ハモグリバエ類					
そば	ヨトウムシ	1000～2000倍				
	ハスモンヨトウ	1000倍				
オクラ						
未成熟とうもろこし	オオタバコガ					
ばれいしょ				収穫7日前まで		
	ハスモンヨトウ	1000～2000倍				
さといも	スズメガ類					
	ハスモンヨトウ					
かんしょ	ナカジロシタバ	**16倍**	**800mℓ**			**無人航空機による散布**
		32倍	**1.6ℓ**			
花き類・観葉植物	オオタバコガ、ハスモンヨトウ	1000倍	100～300ℓ	発生初期	4回以内	散布
きく(葉)	オオタバコガ			収穫14日前まで	2回以内	
さんしょう(葉)	アゲハ類			収穫21日前まで		
食用ミニバラ	ハスモンヨトウ			収穫前日まで		
食用ぎく	オオタバコガ			収穫7日前まで		
しょくようほおずき	アザミウマ類			収穫3日前まで		
しそ、しそ(花穂) バジル、タラゴン	ハスモンヨトウ			収穫7日前まで		
みしまさいこ						

【使用上の注意】(抜粋)

- 使用前によく振ってください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないように注意してください。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ってください。
  - ①散布は各散布機種の散布基準に従って実施してください。
  - ②無人航空機による散布にあっては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
  - ③散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
  - ④特定の農薬(混用可能が確認されているもの)を除いて原則として他の農薬との混用は行わないでください。
  - ⑤散布終了後は次の事項を守ってください。
    - ⓐ使用後の空の容器は放置せず、適切に処理してください。
    - ⓑ使用残りの薬液は必ず安全な場所に責任者をきめて保管してください。
    - ⓒ機体散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 小児の手の届く所には置かないでください。
- 空袋・空容器は圃場等に放置せず、適切に処理してください。

2022年1月作成 18,000 全新企画社 P3202201001

JAグループ
農協 | 全農 | 経済連
全農 は登録商標 第4702318号

協友アグリ株式会社
東京都中央区日本橋小網町6－1
https://www.kyoyu-agri.co.jp