

IPM関連剤

ピタイチ®

グリセリンクエン酸脂肪酸エステル…………… 50.0%

種類名／グリセリンクエン酸脂肪酸エステル乳剤
農林水産省登録／第24184号
毒性／普通物*
有効年限／4年
危険物表示／4－3石
包装／1ℓ×12

特 長

- 食品添加物を有効成分とする気門封鎖剤です。
- 使用回数に制限がなく、収穫前日まで使用可能です。
- 物理的に作用するため、薬剤抵抗性が発達したハダニ類にも効果を発揮します。
- 天敵や有用昆虫に対する影響が少ない薬剤です。

適用病害虫と使用法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10a当り使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法
りんご	ハダニ類	500倍	200～700ℓ	収穫前日まで	—	散布
野菜類 (いちご、トマト、ミニトマトを除く)	アブラムシ類 コナジラミ類 ハダニ類 アザミウマ類		100～300ℓ			
いちご トマト ミニトマト	うどんこ病					
花き類・ 観葉植物 (きくを除く)	アブラムシ類 コナジラミ類 ハダニ類			発生初期		
	うどんこ病			発病初期		
きく	アブラムシ類 ハダニ類 アザミウマ類			発生初期		

使用にあたって

■使用上の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布液の調製に際してはよくかき混ぜ、調製後はなるべく早く使用してください。
- 本剤は散布液が直接害虫にかからないと効果がないため、害虫にむらなく薬液がかかるよう葉の表裏にていねいに散布してください。
- 本剤は害虫の増殖や圃場外からの飛び込みが活発なときには、5～7日間隔の連続2回散布や他剤との輪番で使用してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

■薬害

- 作物の幼苗期、軟弱徒長苗、高温時など一般に薬害の生じやすい条件では、本剤の使用をさけてください。
- 施設栽培で施設内が多湿な場合は、散布前後に十分な換気を行ってください。また、極端な多湿となりやすい条件の場合は使用をさけてください。

- トマトおよびミニトマトに使用する場合、薬液の滞留部の一部に葉害を生じることがあるので、注意してください。

■安全使用上の注意

- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 危険物第四類第三石油類に属するので火気には十分注意してください。

■貯蔵上の注意

- 密栓し、火気や直射日光をさけ、食品と区別して、低温で子供の手のとどかない場所に保管してください。

本資料の記載内容は2026年7月22日現在の登録内容に基づいています。