殺菌剤

ノンブラス®フロアブル

トリシクラゾール……8.0%
フェリムゾン……15.0%

種類名／トリシクラゾール・フェリムゾン水和剤
登録番号／第20090号
毒性／普通物*
有効年限／4年（500mℓ）、1年（10ℓ）
包装／500mℓ×20、10ℓ

特　長

- 有効成分フェリムゾン（治療剤）に浸透移行性を持ったビームを組み合わせた水稲用殺菌剤です。
- 治療効果と予防効果を兼備し、適期幅が広く残効性に優れています。
- 有効成分のフェリムゾンとビームはともに散布後、速やかに稲体内に浸透しますので、降雨による影響が少なく、散布後の急な降雨や、降雨のあい間の散布でも防除効果を発揮します。
- 他のいもち病防除薬剤と全く異なるタイプのフェリムゾン、メラニン合成阻害（還元酵素阻害型）系いもち病防除剤ビームとも他剤で効きにくくなったいもち病菌に対しても優れた効果を発揮します。

適用病害と使用法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用病害名	希釈倍数	10a当り使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法
稲	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ （ごま葉枯病菌） 変色米 （アルタナリア菌 エピコッカム菌 カーブラリア菌） もみ枯細菌病 内穎褐変病 稲こうじ病	1000倍	60～150ℓ	収穫7日前まで	本剤　2回 トリシクラゾール剤　4回 ［育苗箱への処理は1回、本田では3回］ フェリムゾン剤　2回	散布
	いもち病	300倍	25ℓ			
		原液	120mℓ			空中散布
		8倍	800mℓ			
		30倍	3ℓ			
		8倍	800mℓ			無人ヘリ散布

使用者への被害防止方法（調製・散布）
稲：農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣

使用にあたって

■使用上の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤は長期間貯蔵しておくと分離するので、使用の際は容器をよく振って均一な状態に戻してから所定量を取り出してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 本剤を希釈倍数300倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用してください。
- 空中散布および無人ヘリコプター散布に関する注意については「製品情報と注意事項」の見方、「空中散布、無人航空機（無人ヘリコプター等）散布・滴下に関する注意」をご参照ください。

●散布薬液の飛散によって動植物、特に野菜類の幼苗、なし（二十世紀、幸水、新水等）等の農作物の危被害や自動車の塗装等に被害を与えるおそれがあるなど、各分野に影響があるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
●本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

■薬　害

●野菜類の幼苗およびなし（二十世紀、幸水、新水等）には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
●たばこ、けいとうおよび幼植物のだいず・あずき・いんげんまめには薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。

■安全使用上の注意

●飲み込むと有害です。
●吸入すると有害です。
●ミストの吸入をさけてください。
●屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。
●使用の際、飲食または喫煙をしないでください。
●作業後は手足、顔などをよく洗い、うがいをしてください。
●誤って飲み込んだ場合、気分が悪いときは医師の手当てを受けさせてください。
●吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。気分が悪いときは医師の手当てを受けてください。

■貯蔵上の注意

●密栓し、直射日光をさけ、なるべく低温な場所に保管してください。

本資料の記載内容は2026年7月22日現在の登録内容に基づいています。