

水稻除草剤

デルタアタック® ジャンボ

イマズスルフロン	2.25%
オキサジクロメホン	0.75%
ピラクロニル	5.0%
プロモブチド	22.5%

種類名/イマズスルフロン・オキサジクロメホン・
ピラクロニル・プロモブチド粒剤
農林水産省登録/第23696号
毒性/普通物*
有効年限/3年
包装/(40g×10)×10、4kg×1

特 長

- ノビエ(2.5葉期)に安定した効果と長期残効性を持つ一発処理除草剤です。
- SU抵抗性雑草および、多年生難防除雑草まで幅広く優れた効果を示します。
- 効果の発現が非常に速い特性があります。
- 温度による効果変動が少ない薬剤です。
- 移植直後処理も可能です。

適用雑草と使用法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用雑草名	使用時期	10a当り 使用量	総使用回数*	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ウリカワ ミスガヤツリ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ コウキヤガラ シズイ	移植直後～ ノビエ2.5葉期 但し、 移植後30日まで	小包装 (パック) 10個 (400g)	本剤 イマズスルフロン剤 1回 オキサジクロメホン剤 2回 ピラクロニル剤 2回 プロモブチド剤 2回	水田に 小包装 (パック) のまま投 げ入れる
直播水稲	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミスガヤツリ セリ	稲1葉期～ ノビエ2.5葉期 但し、 収穫90日前まで			

使用にあたって

■使用上の注意

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに時期を失ないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意してください。ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミスガヤツリは2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期まで、オモダカ、クログワイは発生前から発生始期まで、コウキヤガラは発生始期まで、シズイは草丈3cmまでが本剤の散布適期です。また、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く遅い発生のもので十分効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。
- 散布に当たっては、水の出入りを止め5～6cmの湛水状態に保ってください。本剤散布後、少なくとも3～4日間は通常の湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 本剤は小包装(パック)のまま、10アール当り10個の割合で水田に均等に投げ入れてください。
- パックに使用しているフィルムは水溶性なので、ぬれた手で作業したり、降雨で破袋することがないようにしてください。
- 薬や浮き草が多発している水田では、拡散が不十分となり部分的な薬害や効果不足を生じることがあるので使用をさけてください。

- 浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平作業および植え付けはていねいに行ってください。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいに行ってください。
- 空袋等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用してください。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

■薬害

- 軟弱な苗を移植した水田、極端な浅植えをした水田、極端な深水となった水田および砂質土で漏水の大きな水田(減水深2cm/日以上)では、薬害が発生するおそれがあるので使用をさけてください。
- 直播水稻栽培では、稲の根が露出する条件では薬害が生じるおそれがあるので注意してください。
- 本剤は、その殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意してください。
- いぐさ栽培予定の水田では使用しないでください。
- 本剤を使用した水田の田面水は、他作物の灌水に用いないでください。

■水産動植物への注意

- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

■安全使用上の注意

- 本剤は水溶性フィルムで小包装化されているため、ぬれた手で触らないでください。
- 水溶性フィルム包装が破袋した場合は以下の点に注意してください。
 - ①眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
 - ②皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
 - ③かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

■貯蔵上の注意

- 水溶性フィルムは吸湿性があるので、湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を固く閉じて保管してください。また、強く加圧されると水溶性フィルムが劣化するおそれがあるので下積みにならないようにしてください。
- 密封し、直射日光を避け、食品と区別して、子供の手のとどかないなるべく低温で乾燥した場所に保管してください。

本資料の記載内容は2023年1月17日現在の登録内容に基づいています。