

殺菌剤

ノンブラス[®]粉剤DL

トリシクラゾール……………0.5%
フェリムゾン……………2.0%

種類名／トリシクラゾール・フェリムゾン粉剤
農林水産省登録／第17954号
毒性／普通物*
有効年限／4年
包装／3kg×8

特 長

- ノンブラスは他のいもち病防除剤とは全く異なる構造式と作用機構の化合物「フェリムゾン」に、浸透移行性を持ち、侵入阻止等による予防効果に定評のある「ビーム」を組み合わせた水稻殺菌剤です。
- 広範囲の病原菌に高い活性を示します。
- いもち病に対し決め手になる鋭い治療効果を発揮します。
- 適期幅が広く安定した防除効果が得られます。
- 他剤耐性菌に対しても優れた防除効果を発揮します。

適用病害と使用方法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用病害名	10a当り 使用量	使用時期	総使用回数*	使用方法
稲	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) (すじ葉枯病菌) 変色米 (カーブラリア菌)	3～4kg	収穫7日前 まで	本剤 トリシクラゾール剤 2回 4回 [育苗箱への処理は1回、 本田では3回] フェリムゾン剤 2回	散布
	内穎褐変病 もみ枯細菌病 稲こうじ病	4kg			



使用者への被害防止方法(調製・散布)

稲：農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣



使用にあたって

■使用上の注意

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼって散布してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

■薬 害

- 野菜類の幼苗およびなし(二十世紀、幸水、新水等)には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- たばこ、けいとうおよび幼植物のだいず・あずき・いんげんまめには薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。

■安全使用上の注意

- 吸入すると有害です。
- 粉じんの吸入をさけてください。
- 屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。
- 吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。気分が悪いときは医師の手当てを受けてください。

■貯蔵上の注意

- 密封し、直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。

本資料の記載内容は2026年7月22日現在の登録内容に基づいています。