

殺虫剤

フローバック®DF

バチルス チューリンゲンシス菌の
生芽胞及び産生結晶毒素…………… 10.0%
(力価として1000B.m.i 単位/mg)

種類名／BT水和剤
農林水産省登録／第20653号(住友化学登録)
毒性／普通物*
有効年限／5年
包装／500g×20

特 長

- BT生菌剤(アイザワイ系)。ヨトウムシ、ハスモンヨトウなどのチョウ目害虫に対して高い効果を示します。
- 農薬の成分使用回数にカウントされません。
- 有機JAS規格の定める有機農作物の生産に使用可能です。
- 収穫前日まで使用可能です。

適用害虫と使用法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10a 当り 使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法
果 樹 類	ケムシ類 ハマキムシ類	1000～2000倍	200～ 700 ℓ	発生初期 但し、収穫 前日まで	—	散布
野 菜 類	アオムシ コナガ シロイチモジヨトウ		1000倍			
	オオタバコガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ					
キ ャ ベ ツ	ネギアザミウマ ハイマダラノメイガ	1000～2000倍				
	ウワバ類					
は く さ い	ハイマダラノメイガ	1000倍				
	ウワバ類	1000～2000倍				
だ い こ ん チ ン ゲ ン サ イ ブ ロ ッ コ リ ー	ハイマダラノメイガ	1000倍				
に ん に く	ネギコガ	1000～2000倍				
そ ば	ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2000倍				
雑 穀 類 (そばを除く)	アワノメイガ					
飼料用とうもろこし						
花き類・観葉植物	オオタバコガ	1000倍		発生初期		

使用にあたって

■使用上の注意

- 本剤は若齢幼虫に有効なので、若齢幼虫期に時期を失しないように散布してください。
- 使用に当っては、展着剤を加用することが望ましいです。
- 空中散布には使用しないでください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。



●ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。

- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合には、使用者の責任において事前に葉害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

■混用・葉害

- アルカリ性の強い石灰硫黄合剤、ボルドー液などの農薬およびアルカリ性の強い葉面施用の肥料などの混用はさけてください。

■毒



●蚕に対する毒性があるので、養蚕主産県その他主要養蚕地帯および養蚕農家、共同飼育場などの周辺では施用しないでください。また、これら以外の場所でも付近に桑園がある場合は、飛散しにかからないよう風向等に十分注意して散布してください。なお、本剤の使用に当っては、散布地域の使用規制に従い、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

■安全使用上の注意



●散布液調製時および散布時は保護メガネ、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。

- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないように注意してください。皮膚に付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

■貯蔵上の注意

- 密封し、直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。
- 本剤は吸湿すると固化したり、効果が低下したりすることがあるので、貯蔵に当っては湿気に注意し、特に使用残りの薬剤は密封して乾燥した冷暗所に貯蔵してください。

本資料の記載内容は2025年8月18日現在の登録内容に基づいています。