

殺菌剤

ノンブラスバリダ[®]粉剤DL

トリシクラゾール	0.5%
バリダマイシンA	0.3%
フェリムゾン	2.0%

種類名／トリシクラゾール・バリダマイシン
・フェリムゾン粉剤
農林水産省登録／第17955号
毒性／普通物^{*}
有効年限／4年
包装／3kg×8

特 長

- 本剤は「ノンブラス」と、紋枯病に優れた効果を示す「バリダマイシン」との混合剤です。
- ノンブラスは、
 - ①有効成分フェリムゾン（治療剤）に浸透移行性を持ったビームを組み合わせた水稲用殺菌剤です。
 - ②治療効果と予防効果を兼備し、適期幅が広く残効性に優れています。
 - ③有効成分のフェリムゾンとビームはともに散布後、速やかに稲体内に浸透しますので、降雨による影響が少なく、散布後の急な降雨や、降雨のあい間の散布でも防除効果を発揮します。
- バリダマイシンは紋枯病に対して効果の持続性に優れ、多発条件下でも優れた効果を発揮します。

適用病害と使用法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用病害名	10a当り 使用量	使用時期	総使用回数 [*]	使用方法
稲	いもち病 紋枯病 こま葉枯病 穂枯れ（こま葉枯病菌） 疑似紋枯症 （褐色菌核病菌） （赤色菌核病菌） 褐色紋枯病菌 変色米（カーブラリア菌）	3～4kg	収穫14日前 まで	本剤 2回 トリシクラゾール剤 4回 〔育苗箱への処理は1回、 本田では3回〕 バリダマイシン剤 6回 〔育苗箱灌注は1回、 本田では5回〕 フェリムゾン剤 2回	散布



使用者への被害防止方法（調製・散布）

稲：農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣



使用にあたって

■使用上の注意

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しほって散布してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

■薬 害

- 野菜類の幼苗およびなし（二十世紀、幸水、新水等）には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- たばこ、けいとうおよび幼植物のだいず・あずき・いんげんまめには薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- きく（秀芳の力等）には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。

■生活環境動植物への注意

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。

■安全使用上の注意

- 吸入すると有害です。
- 粉じんの吸入をさけてください。

- 屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。
 - 吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。気分が悪いときは医師の手当てを受けてください。
- 貯蔵上の注意
- 密封し、直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。

本資料の記載内容は2026年7月22日現在の登録内容に基づいています。